

Aus der Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft

# Artenliste der Vögel Deutschlands

Peter H. Barthel & Thorsten Krüger

unter Mitarbeit von Einhard Bezzel, Martin Päckert, Frank D. Steinheimer & Hans-Günther Bauer

---

Barthel PH & Krüger T 2018: Checklist of the birds of Germany. Vogelwarte 56: 171-203.

The birds of Germany are presented in a current checklist as of 30th June 2018. Each species is assigned to one of three categories. For the first time, this checklist also includes all recorded subspecies. In addition, concise information on the distribution and abundance of breeding birds and the status outside the breeding season is provided. The list should be used as a reference in systematics and taxonomy, for scientific, German and English names as well as for the classification of records.

In Germany, a total of 527 bird species have been recorded since 1800 (Categories A, B and C). Those 486 species reliably documented in an apparently wild state since 1950 are included in Category A (Ao if no photographic or specimen documentation is available). 32 species regarded as genuine vagrants prior to 1950 only are assigned to Category B, 12 of them recorded only as possible or likely escapees thereafter are indicated with BD or BE (Column 4).

287 species of Categories A to C in Column 5 have bred in Germany since 1800, but only 254 species form the current breeding avifauna, of which seven were introduced and have apparently established self-sustaining breeding populations in the wild (Category C).

Column 6 of the checklist gives the status outside the breeding season as resident (J/j), winter visitor (W/w) or migrant (Z/z). 103 species have been classified as scarce with on average less than five records per year since 1980 (S) and 84 species as vagrants with less than five records in total since 1950 (s).

Five species listed in Appendix 1 (Category D, species with currently uncertain Category assignment) are not included in the German checklist. Appendix 2 gives a selection out of nearly 400 species which probably or certainly escaped from captivity, were released or introduced to Germany, e.g. through ship-assistance (Category E). The selection is restricted to 60 species considered genuine vagrants in some other European countries, and some species which have bred in the wild in Germany but have not (yet) established populations.

For further explanations and comments concerning systematics, taxonomy, categories, names and other changes compared to the last version of the checklist, see Barthel et al. (2018).

✉ PHB: Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck. E-Mail: redaktion@limicola.de  
TK: Staatliche Vogelschutzwarte (NLWKN), Ratsherr-Schulze-Str. 10, 26122 Oldenburg.  
E-Mail: thorsten.krueger@nlwkn-h.niedersachsen.de

---

## Einführung

Ornithologische Systematik, Taxonomie und Nomenklatur haben sich in den letzten 25 Jahren stärker verändert als die Zusammensetzung der Vogelwelt Deutschlands. Dies wird besonders beim Vergleich der aktuellen Liste mit den beiden vorherigen (Barthel 1993; Barthel & Helbig 2005) der dafür verantwortlichen Kommission der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) deutlich. Naturgemäß liegen Anspruch, Informationsgehalt und Nutzen von aktuellen Artenlisten vornehmlich im taxonomisch-systematischen Bereich, sollen also als aktuelle Grundlage für die Reihenfolge und Benennung der Vogelarten dienen und zudem kenntlich machen, in welcher der Vorkommenskategorien sie in Deutschland stehen. Selbstverständlich sind auch weiterhin wissenschaftlich belegte zusätzliche avifaunistische Statusangaben enthalten. Gegenüber der vorherigen Zusam-

menstellung wurden 24 seit dem Jahr 2005 erstmals in Deutschland nachgewiesene Vogelarten aufgenommen und einige Kategorisierungen überarbeitet.

Die vorliegende Liste enthält, wie in ganz Europa üblich, die seit dem Jahr 1800 im Berichtsgebiet nachgewiesenen Arten und endet mit dem 30. Juni 2018. Erneut wurde versucht, noch mehr über die Grundanforderungen einer nationalen Artenliste hinaus gehende Informationen als bisher leicht erfassbar auf geringem Raum unterzubringen und gleichzeitig die Vergleichbarkeit mit Listen anderer europäischer Länder durch konsequente Anwendung der international klar definierten Basiskategorien zu gewährleisten.

Eine grundlegende Veränderung gegenüber der letzten Version ergibt sich aus dem im September 2017 vom Vorstand der DO-G gefassten Beschluss, ab Januar 2018

in allen die DO-G betreffenden Belangen konsequent der Weltliste der Vogelarten von Gill & Donsker (2018) zu folgen. Somit entspricht auch diese Artenliste in Reihenfolge sowie wissenschaftlichen und englischsprachigen Namen dieser Vorgabe. Darüber hinaus wurden etwa 20 deutsche Namen an Veränderungen angepasst, die durch die Kommission „Deutsche Namen für die Vögel der Erde“ von DO-G und International Ornithologists’ Union (IOU; vgl. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 2018) vorgegeben sind.

Neu in dieser Version ist auch die Aufnahme der 377 in Deutschland nachgewiesenen Subspezies, die ebenfalls mit zusätzlichen Statusangaben und gelegentlich (dann immer in Anführungszeichen gesetzten) umgangssprachlichen Trivialnamen versehen wurden. Erstmals werden auch die Autoren der wissenschaftlichen Namen aufgeführt, um komplettes und korrektes Zitieren in wissenschaftlichen Publikationen zu erleichtern. Der eigentlich der Kategorie vorbehaltene Buchstabe A wurde in den letzten Versionen auch in den Spalten für Brutstatus und Status außerhalb der Brutzeit mit anderen Bedeutungen benutzt, jetzt aber dort durch ein V (für „Vermehrungsgast“ statt „ausnahmsweiser Brutvogel“) bzw. S (für „Seltenheit“ statt „Ausnahmeerscheinung“) ersetzt, um Verwechslungen zu vermeiden.

Erläuterungen und Kommentare zu dieser Liste finden sich in einem separaten Beitrag (Barthel et al. 2018). Das Verständnis der Liste selbst erschließt sich jedoch allein schon aus den nachfolgenden Legenden zu den einzelnen Spalten.

Gedruckte Fassungen der offiziellen „Artenliste der Vögel Deutschlands“ sind nur in größeren Zeitabständen möglich. Daher wird es zukünftig auf der Webseite der DO-G ([www.do-g.de](http://www.do-g.de)) zusätzlich eine digitale Version geben, die in kürzeren Abständen aktualisiert werden soll.

## Erläuterung der Spalten und Abkürzungen

### Spalte 1: Deutscher Name – *German name*

Die deutschen Namen folgen den offiziellen Vorgaben der Kommission „Deutsche Namen für die Vögel der Erde“ von DO-G und IOU. In Anführungszeichen genannte Bezeichnungen von Unterarten spiegeln deren gelegentliche Verwendung in der deutschsprachigen vogelkundlichen Literatur und im ornithologischen Sprachgebrauch wider, sind jedoch keine offiziellen Namen. – *German names follow the official guidelines of the commission “German names for the birds of the world” of DO-G and IOU. Names of subspecies in quotes reflect their common use in the German ornithological literature but are not official names.*

### Spalte 2 und 3: Wissenschaftlicher Name und Autor

#### – *Scientific name and author*

Die wissenschaftlichen Namen der Arten und (eingekl.) der Unterarten sowie ihre Autoren und die Jah-

re ihrer Beschreibung entsprechen jeweils der aktuellen Liste von Gill & Donsker (2018). – *The scientific names of the species and (indented) subspecies names as well as authors and years of description correspond to those given in Gill & Donsker (2018).*

### Spalte 4: Kategorie – *Category*

Die europaweit gültige Minimalanforderung an eine nationale Vogelliste ist die Einstufung aller seit dem Jahr 1800 in natürlichem Zustand vorgekommenen Arten in eine der Kategorien A, B oder C auf belegter und überprüfbarer wissenschaftlicher Grundlage (Association of European Records and Rarities Committees 1999). Für die deutsche Liste werden daher die nachfolgenden Definitionen verwendet.

A: Die Art wurde seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt (486 Arten; einschließlich Ao). Mit Ao (ohne Beleg) sind die fünf Arten gekennzeichnet, für deren Vorkommen in Deutschland es zwar keinen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonaufnahme o. ä.) gibt oder gab, doch mindestens eine Meldung von der Artenlisten-Kommission als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt wurde. – *Species that have been recorded in an apparently natural state at least once since 1 January 1950. Five species for which there is no specimen, photographic, video or acoustic documentation, but for which at least one report has been accepted by the list committee, are indicated with Ao (486 species, incl. Ao).*

B: Die Art wurde lediglich im Zeitraum vom 1. Januar 1800 bis 31. Dezember 1949, danach jedoch nicht mehr als Wildvogel in Deutschland nachgewiesen (32 Arten; einschließlich der mit BC, BD oder BE markierten Arten, s. u.). – *Species that were recorded in an apparently natural state at least once between 1 January 1800 and 31 December 1949, but have not been recorded thereafter (including those indicated BC, BD or BE, see below) (32 species).*

C: Die gebietsfremde Art wurde in Deutschland als Brutvogel durch den Menschen beabsichtigt (Aussetzungen/Freilassungen) oder unbeabsichtigt (Entkommen aus Haltungen, eingeschleppt oder als in Nachbarländern etabliertes Neozoon von dort eingewandert) eingebürgert (9 Arten). Sie pflanzt sich dabei in voller Freiheit regelmäßig fort und hält oder vergrößert langfristig ohne jede menschliche Hilfe sowie ohne weitere Freisetzungen ihren Bestand. Lokale Populationen bilden dabei jeweils mehrfach neue Teilpopulationen außerhalb des Nahverbreitungsradius der Gründerpopulation. Sind zeitliche und populationsbiologische Faktoren erfüllt, gilt die Art als etabliert. Fünf Subkategorien werden unterschieden. C1: Etablierte eingebürgerte Art, deren Vorkommen ausschließlich auf Aussetzungen zurückgeht (6 Arten). C2: Regional etablierte, eingebürgerte Art, von der es in Deutschland auch

autochthone Wildvogelbestände gibt (viele Arten, hier nicht ausgewiesen, da sie wegen der autochthonen Bestände in der höheren Kategorie A geführt werden). C3: Wiedereingebürgerte Art, deren Brutpopulation komplett erloschen war, nach Aussetzung im ehemaligen Vorkommensgebiet aber wieder dauerhaft etabliert ist (derzeit keine Art). C4: Verwilderte Form einer domestizierten Art mit etablierten Populationen (1 Art). C5: Art, die in Deutschland lediglich als Gastvogel erscheint, aber aus fest etablierten, eingebürgerten Brutpopulationen der Kategorie C anderer europäischer Länder stammt (2 Arten). – *Alien species naturalized as breeding birds in Germany that were either deliberately introduced or accidentally released through human activity. They reproduce regularly in the wild and maintain or increase self-sustaining populations without human assistance and without further releases. Local populations form several new subpopulations outside the near-distribution radius of the founder population. If certain temporal and population-biological criteria are met the species are considered established (9 species). Five subcategories are defined. C1: Established naturalized species whose occurrence is exclusively based on introductions. C2: Regionally established, naturalized species of which autochthonous wild populations are also found in Germany (many species, not indicated and included in Category A). C3: Naturalized re-established species with populations successfully re-established through release in areas of former occurrence (currently none). C4: Naturalized feral form of a domesticated species with established populations in the wild (1 species). C5: Species which only appear in Germany as guests from established populations of alien species in Category C in other European countries (2 species).*

D: Die Art wurde in Deutschland festgestellt, doch bestehen begründete Zweifel, dass sie das Land unter natürlichen Bedingungen erreicht hat. Arten werden nur vorübergehend der Kategorie D zugeordnet, bis z.B. verbesserte Kenntnisse über ihre Brutverbreitung, Zugökologie und ihr Nachweismuster in Mitteleuropa oder zusätzliche Informationen zu einem spezifischen Nachweis ermöglichen, sie in eine andere Kategorie zu überführen. Arten der Kategorie D sind nicht Bestandteil der deutschen Artenliste und im Anhang 1 aufgeführt, sofern nicht vor 1950 erbrachte Nachweise (Kategorie B) auf wahrscheinliche Wildvögel zurückgeführt werden (5 Arten). – *Species that have been recorded in Germany but for which there is reasonable doubt that they have ever occurred under natural circumstances. Species are only temporarily assigned to Category D until, for example, improved knowledge of their breeding distribution, migratory status, pattern of occurrence in Central Europe, or additional information about a specific record allows them to be assigned to another*

*Category. Species assigned to Category D are excluded from the German species list and are not added to the total number of species, unless records before 1950 (Category B) are classified as genuine. The five species of Category D are listed in Appendix 1.*

E: Individuen der Art wurden in Deutschland nur als ausgesetzt, als wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge, als ausschließlich oder überwiegend mit Verkehrsmitteln (meist transatlantischer Schiffstransport) ins Land gelangt, als vorsätzlich freigelassen oder auf andere Weise durch menschliches Zutun nach Europa gekommen festgestellt. Einige Arten haben bereits in Freiheit in Deutschland gebrütet, werden aber nicht als etabliert betrachtet. Diese inzwischen fast 400 Arten umfassende Kategorie ist nicht Bestandteil der deutschen Artenliste. Einige Arten (60) werden jedoch im Anhang 2 aufgeführt, da sie entweder regelmäßig im Freiland auftreten, dort teilweise auch brüten oder in Nachbarländern als wahrscheinliche Wildvögel aufgetreten oder eingestuft worden sind. – *Species recorded as introductions, human-assisted vagrants or escapees from captivity and whose breeding populations (if any) are thought not to be self-sustaining. The almost 400 species of Category E are not included in the German species list and are not shown. 60 of them are listed in Appendix 2 because they can be regularly observed in Germany, may have bred or have started to form local breeding populations which are not (yet) regarded established, or have occurred or been listed in other European countries as genuine vagrants.*

BC, BD, BE: Bei Kombination der Kategorie B mit den Buchstaben C, D oder E werden Nachweise vor 1950 (meist aus dem 19. Jahrhundert) als wahrscheinlich auf Wildvögel zurückgehend betrachtet, während sich seit 1950 eine den Kriterien der Kategorie C entsprechende Brutpopulation etabliert hat (BC1; 1 Art, in den Gesamtsummen jedoch nur in der höheren Kategorie C gezählt) oder Meldungen seit 1950 in die Kategorie D (BD; 7 Arten) oder E (BE; 5 Arten) eingestuft wurden. Vor 1950 als Brutvögel aus Deutschland verschwundene Arten, bei denen Wiedereinbürgungsexperimente noch nicht zu einer den Kriterien der Kategorie C3 entsprechenden Etablierung geführt haben, fallen somit in die Kategorie BE. – *If Category B is combined with C, D or E birds recorded before 1950 are regarded as genuine vagrants, while after 1950 a breeding population according to the criteria of Category C has established itself (BC; 1 species), or birds recorded subsequently are regarded as possible (BD; 7 species) or likely/definite escapees (BE; 5 species).*

#### Spalte 5: Brutstatus – Breeding status

Die Angabe besteht aus der Kombination eines Buchstabens für die Verbreitung in der Fläche (N, R, L) und einer Ziffer für die Häufigkeit (1-6). Daneben können

Buchstaben ein Vorkommen als Vermehrungsgast (V) oder als auf gehandicapte bzw. ausgesetzte Individuen zurückgehend (E) kennzeichnen. Grundlage hierfür sind die Angaben im „Atlas Deutscher Brutvogelarten“ von Gedeon et al. (2014), teilweise aktualisiert. Die Angaben zur Verbreitung in Deutschland beziehen sich ausschließlich auf regelmäßige, alljährlich vorkommende Brutvogelarten.– *The information is given as a combination of letters for the geographical distribution (N, R, L) and a categorial number for the abundance (1-6). In addition, letters may indicate an occurrence as a reproductive guest (V) or as originating from handicapped or released individuals (E). Numbers are based on the data by Gedeon et al. (2014), partly updated. They refer exclusively to regular, annual breeding species.*

**N:** Brutvogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen Deutschlands (152 Arten).– *Regular breeding species found in suitable habitat in large parts of Germany (152 species).*

**R:** Brutvogel nur in bestimmten Regionen (z. B. Alpenraum, Küsten; 75 Arten).– *Regular breeding species, but restricted to certain regions (e.g. the Alps, coastal habitats; 75 species).*

**L:** Brutvogel, aber nur sehr lokal (z. B. in einzelnen Städten), doch hier teilweise in großer Dichte (z. B. Koloniebrüter auf Helgoland; 23 Arten).– *Regular breeding species with only local distribution (e.g. in some cities), but often occurring in high density (e.g. seabirds on the island of Heligoland; 23 species).*

**V:** Hat seit 1800 ausnahmsweise einmal oder mehrfach, jedoch nicht in mehr als fünf aufeinander folgenden Jahren gebrütet und ist daher nicht als regelmäßiger Brutvogel einzustufen (vgl. Grüneberg et al. 2015), sondern als Vermehrungsgast (25 Arten). Diejenigen davon, die lediglich vor 1950 ausnahmsweise gebrütet haben, sind mit V(B) gekennzeichnet (3 Arten).– *Species has bred once or several times since 1800, but not more than five years in a row and is therefore not regarded as regular breeding species (25 species). Those of them that only bred before 1950 are marked V(B) (3 species).*

**0:** Ausgestorbener, ehemals regelmäßiger Brutvogel, von dem es seit 2005 kein regelmäßiges Brutvorkommen mehr gibt und in den letzten fünf Jahren keine neue Brut mehr gemeldet wurde (12 Arten). Davon sind die sechs bereits vor 1950 ausgestorbenen Arten mit 0 (B) gekennzeichnet. – *Former regular breeding species but no breeding record since at least 2005 (12 species), for six of them indicated with 0 (B) since at least 1950.*

**E:** Die Brutten im Freiland gehen ausschließlich auf flugunfähige bzw. anderweitig in ihrer Fortbewegung teilweise bis ganz eingeschränkte oder entflo gene (VE; 8 Arten) sowie ausgesetzte Vögel zurück (L1E; 4 Arten).– *Breeding records relating to flightless or otherwise restricted or escaped (VE; 8 species) or released birds (L1E; 4 species).*

- 1: 1-100 Brutpaare (34 Arten). – *1-100 breeding pairs (34 species).*
- 2: 101-1.000 Brutpaare (34 Arten).– *101-1,000 breeding pairs (34 species).*
- 3: 1.001-10.000 Brutpaare (60 Arten).– *1,001-10,000 breeding pairs (60 species).*
- 4: 10.001-100.000 Brutpaare (58 Arten).– *10,001-100,000 breeding pairs (58 species).*
- 5: 100.001-1.000.000 Brutpaare (42 Arten).– *100,001-1,000,000 breeding pairs (42 species).*
- 6: Mehr als 1 Million Brutpaare (22 Arten).– *More than 1 million breeding pairs (22 species).*

#### Spalte 6: Status außerhalb der Brutzeit

##### – *Status outside the breeding season*

**J/j:** Jahresvogel; Brutpopulation und Winterbestände sind nicht immer identisch; der Kleinbuchstabe weist auf eine durchschnittliche Populations- oder Bestandsgröße von weniger als 100 Individuen hin.– *Present throughout the year, breeding and winter population not always identical (J); a small letter (j) indicates an average population size below 100 individuals.*

**Z/z:** Zugvogel, bei dem deutsche Brutvögel das Land im Winter verlassen und Vögel anderer Regionen häufig (Z) oder mit durchschnittlich weniger als 100 Individuen pro Jahr spärlich (z) durchziehen. – *Migrant/transient; majority of breeding birds leave Germany in winter or birds from other areas stopover in significant numbers (Z) or are recorded on average with less than 100 individuals per year (z).*

**W/w:** Wintergast; Vögel meist nordöstlicher Herkunft überwintern regelmäßig zumindest in einigen Landesteilen, besonders im Norden (W), jedoch mit durchschnittlich weniger als 100 Individuen (w). – *Winter guest; birds of mainly north-eastern origin wintering regularly at least in some parts of Germany, mainly in the North (W) but on average with less than 100 individuals per year (w).*

**S/s:** Seltenheit; seit 1980 gab es durchschnittlich weniger als fünf Nachweise pro Jahr (S; 103 Arten) oder es liegen seit 1950 insgesamt weniger als fünf deutsche Nachweise vor (s; 84 Arten).– *Scarce or accidental vagrant; since 1980 on average less than 5 records per year (S) or since 1950 less than 5 records in total (s).*

Die Kennbuchstaben J, Z und W können auch kombiniert sein, wenn Individuen einer Art mit unterschiedlichem Status vorkommen.– *The letters J, Z and W may be combined to specify the different status of individuals of the same species.*

#### Spalten 5 und 6: Statusangaben zu den Unterarten

##### – *Subspecies status*

Sofern von einer Vogelart lediglich eine Unterart in Deutschland festgestellt wurde, gelten für sie die in der Zeile darüber für die Art gemachten Statusangaben. Bei Arten, die in mehreren Subspezies nachgewiesen sind, werden deren Abweichungen von den allgemeinen

Statusangaben für die Art jeweils in den Spalten 5 und 6 der Zeile für die Unterart angegeben. Wenn innerhalb einer polytypischen Art eine der aufgeführten Unterarten lediglich vor 1950 ausnahmsweise nachgewiesen wurde, ist sie mit s (B) gekennzeichnet. Bei einzelnen Seltenheiten ist bislang nicht sicher, welche Subspezies in Deutschland festgestellt wurde. Dann sind die vermuteten oder am wahrscheinlichsten beteiligten Unterarten aufgeführt und hinter dem wissenschaftlichen Namen mit (?) gekennzeichnet.– *If only one subspecies of a bird species occurs in Germany the status information given for the species in the line above applies to this subspecies. For species that fall into several subspecies, deviations from the general status information for the species are specified in columns 5 and 6 in the rows for the subspecies. If within a polytypical species one of the listed subspecies was only exceptionally recorded before 1950 it is marked with s (B). For some rarities it is not yet certain which subspecies have been recorded in Germany. In these cases, the most suspected or most likely involved subspecies are listed and indicated with (?) after the scientific name.*

#### **Spalte 7: Englischer Name – English name**

Die englischsprachigen Namen folgen der internationalen IOC-Liste von Gill & Donsker (2018).– *English names follow the international IOC list (Gill & Donsker 2018).*

#### **Anhänge**

##### **Anhang 1: Arten der Kategorie D – *Species of Category D***

Bei diesen fünf Arten in Kategorie D bestehen noch Zweifel, ob sie auf natürliche Weise nach Deutschland gelangt bzw. als reproduzierende Neozoen tatsächlich eingebürgert sind. Sie sind nicht Bestandteil der deutschen Artenliste.– *See definition of Category D above.*

##### **Anhang 2: Ausgewählte Arten der Kategorie E – *Selected species of Category E***

Nur einige Arten werden aufgeführt, die als wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge festgestellt wurden, teilweise schon gebrütet haben und auch in Listen anderer europäischer Länder geführt werden, dort manchmal in Kategorie A oder D.– *See definition of Category E above.*

#### **Dank**

Für kritische und hilfreiche Kommentare danken wir Jochen Dierschke, für die freundliche Überarbeitung der englischen Textpassagen Timothy Coppack.

#### **Zusammenfassung**

Die Vögel Deutschlands werden in einer aktuellen Artenliste (Checklist) auf dem Stand vom 30.6.2018 vorgestellt. Jede Art ist ihrem Vorkommen in Deutschland entsprechend einer von drei Kategorien zugeteilt worden. Darüber hinaus sind in dieser Fassung erstmals auch alle nachgewiesenen Unterarten aufgeführt. Zudem werden Angaben zur Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel sowie zum Status außerhalb der Brutzeit gemacht. Die Liste soll als Referenz für Systematik, wissenschaftliche, deutsche und englische Namen sowie für die Einordnung von Nachweisen dienen.

In Deutschland wurden seit dem Jahr 1800 527 Vogelarten nachgewiesen (Kategorien A, B und C), seit 1950 nur 486. 287 Vogelarten haben seit 1800 in Deutschland gebrütet, doch sind nur 254 von ihnen als Bestandteil der rezenten Brutvogelwelt einzustufen. Bei sieben von ihnen handelt es sich um ursprünglich nicht autochthone, sondern ausgesetzte und offenbar fest etablierte Arten (Kategorie C).

In den Anhängen 1 (Kategorie D, Arten, deren Zuordnung in eine Kategorie derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit möglich ist) und 2 (Kategorie E, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sicher entflohen, ausgesetzt, auf Schiffen nach Deutschland gelangt etc., teilweise auch brütend) aufgeführte Arten sind nicht Bestandteil der nationalen Artenliste.

Erläuterungen zu Veränderungen gegenüber der letzten Artenliste finden sich bei Barthel et al. (2018).

#### **Literatur**

- Association of European Records and Rarities Committees 1999: Guidelines for Rarities Committees. Compilation of the Texel Guidelines and the Helgoland-, Kecske-, Blahova- and Lednice Minutes. <http://aerc.eu/guidelines.html> (letzter Zugriff am 22.8.2018).
- Barthel PH 1993: Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113–135.
- Barthel PH & Helbig AJ 2005: Artenliste der Vögel Deutschlands. Limicola 19: 89–141.
- Barthel PH, Bezzel E, Krüger T, Päckert M & Steinheimer FD 2018: Artenliste der Vögel Deutschlands 2018: Aktualisierung und Änderungen. Vogelwarte 56: 205–224.
- Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 2018: Kommission „Deutsche Namen für die Vögel der Erde“ <http://www.do-g.de/die-do-g/kommission-deutsche-namen-voegel-der-erde/?L=0%2F> (letzter Zugriff am 22.8.2018).
- Gedeon K, Grüneberg C, Mitschke A, Sudfeldt C, Eikhorst W, Fischer S, Flade M, Frick S, Geiersberger I, Koop B, Kramer M, Krüger T, Roth N, Ryslavý T, Stübing S, Sudmann SR, Steffens R, Vöbler F & Witt K 2014: Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Gill F & Donsker D (Hrsg) 2018: IOC World Bird List (v 8.2). doi: 10.14344/IOC.ML.8.2. <http://www.worldbirdnames.org> (letzter Zugriff am 22.8.2018).
- Grüneberg G, Bauer H-G, Haupt H, Hüppop O, Ryslavý T & Südbrock P 2015: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52: 19–67.

## ENTENVÖGEL

## ORDNUNG ANSERIFORMES

	Familie Anatidae					Ducks, Geese and Swans
<b>Entenverwandte</b>						
<b>Ringelgans</b>	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	A	ZW		Brant Goose
„Pazifische Ringelgans“	<i>B. b. nigricans</i>	(Lawrence, 1846)		zw		
„Dunkelbüchige Ringelgans“	<i>B. b. bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)		ZW		
„Hellbüchige Ringelgans“	<i>B. b. hrota</i>	(Müller, OF, 1776)		zw		
<b>Rothalsgans</b>	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)	A	VE	zw	Red-breasted Goose
<b>Kanadagans</b>	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)	C1	N3	JW	Canada Goose
	<i>B. c. parvipes</i>	(Cassin, 1852)			S (E)	
	<i>B. c. canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Weißwangengans</b>	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)	A	R2	ZW	Barnacle Goose
<b>Streifengans</b>	<i>Anser indicus</i>	(Latham, 1790)	C5	L1E	jw	Bar-headed Goose
<b>Graugans</b>	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Greylag Goose
„Westliche Graugans“	<i>A. a. anser</i>	(Linnaeus, 1758)				
„Östliche Graugans“	<i>A. a. rubrirostris</i>	Swinhoe, 1871			S	
<b>Waldsaatgans</b>	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	A		ZW	Taiga Bean Goose
	<i>A. f. fabalis</i>	(Latham, 1787)				
<b>Kurzschnabelgans</b>	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1834	A	VE	ZW	Pink-footed Goose
<b>Tundrasaatgans</b>	<i>Anser serrirostris</i>	Gould, 1852	A	VE	ZW	Tundra Bean Goose
	<i>A. s. rossicus</i>	Buturlin, 1933				
<b>Blässgans</b>	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)	A	VE	ZW	Greater White-fronted Goose
„Grönländische Blässgans“	<i>A. a. flavirostris</i>	Dalgety & Scott, PM, 1948			S	
	<i>A. a. albifrons</i>	(Scopoli, 1769)				
<b>Zwerggans</b>	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	zw		Lesser White-fronted Goose
<b>Höckerschwan</b>	<i>Cygnus olor</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A	N4	JZW	Mute Swan
<b>Zwergschwan</b>	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)	A		ZW	Tundra Swan
„Pfeifschwan“	<i>C. c. columbianus</i>	(Ord, 1815)			s	
	<i>C. c. bewickii</i>	Yarrell, 1830				
<b>Singschwan</b>	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R1	JZW	Whooper Swan
<b>Nilgans</b>	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	(Linnaeus, 1766)	C1	N3	J	Egyptian Goose
<b>Brandgans</b>	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	JZW	Common Shelduck
<b>Rostgans</b>	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	BC1	N2	Jw	Ruddy Shelduck
<b>Mandarinente</b>	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758)	C1	N2	J	Mandarin Duck
<b>Knäkente</b>	<i>Spatula querquedula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	Z	Garganey
<b>Blauflügelente</b>	<i>Spatula discors</i>	(Linnaeus, 1766)	A		S	Blue-winged Teal
<b>Löffelente</b>	<i>Spatula clypeata</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	JZW	Northern Shoveler
<b>Schnatterente</b>	<i>Mareca strepera</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	JZW	Gadwall
	<i>M. s. strepera</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Pfeifente</b>	<i>Mareca penelope</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R1	JZW	Eurasian Wigeon
<b>Kanadapfeifente</b>	<i>Mareca americana</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A		S	American Wigeon
<b>Stockente</b>	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	JZW	Mallard
	<i>A. p. platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Spießente</b>	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758	A	R1	JZW	Northern Pintail

<b>Krickente</b>	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	JZW	Eurasian Teal
<b>Carolinakrickente</b>	<i>Anas carolinensis</i>	Gmelin, JF, 1789	A	S		Green-winged Teal
<b>Marmelente</b>	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétriés, 1832)	BE	s		Marbled Duck
<b>Kolbenente</b>	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	A	R3	JZW	Red-crested Pochard
<b>Tafelente</b>	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	JZW	Common Pochard
<b>Moorente</b>	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)	A	L1	jzw	Ferruginous Duck
<b>Ringschnabelente</b>	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)	A	S		Ring-necked Duck
<b>Reiherente</b>	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Tufted Duck
<b>Bergente</b>	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761)	A	L1	JZW	Greater Scaup
	<i>A. m. marila</i>	(Linnaeus, 1761)				
<b>Kanadabergente</b>	<i>Aythya affinis</i>	(Eyton, 1838)	A	VE	s	Lesser Scaup
<b>Scheckente</b>	<i>Polysticta stellaris</i>	(Pallas, 1769)	A	S		Steller's Eider
<b>Prachteiderente</b>	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	S		King Eider
<b>Eiderente</b>	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	JZW	Common Eider
	<i>S. m. mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Kragnetente</b>	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	BD	s		Harlequin Duck
<b>Brillenente</b>	<i>Melanitta perspicillata</i>	(Linnaeus, 1758)	A	s		Surf Scoter
<b>Samttente</b>	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	A	ZW		Velvet Scoter
<b>Höckersamtente</b>	<i>Melanitta deglandi</i>	(Bonaparte, 1850)	A	s		White-winged Scoter
„Kamtschatkasamtente“	<i>M. d. stejnegeri</i>	(Ridgway, 1887)				
<b>Trauerente</b>	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	A	ZW		Common Scoter
<b>Pazifiktrauerente</b>	<i>Melanitta americana</i>	(Swainson, 1832)	A	s		Black Scoter
<b>Eisente</b>	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	ZW		Long-tailed Duck
<b>Schellente</b>	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	ZW	Common Goldeneye
	<i>B. c. clangula</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Spatelente</b>	<i>Bucephala islandica</i>	(Gmelin, JF, 1789)	BE	s		Barrow's Goldeneye
<b>Zwergsäger</b>	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	VE	ZW	Smew
<b>Gänsesäger</b>	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	A	R3	ZW	Common Merganser
	<i>M. m. merganser</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Mittelsäger</b>	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	A	R2	ZW	Red-breasted Merganser
<b>Schwarzkopf-Ruderente</b>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(Gmelin, JF, 1789)	C5	V	j	Ruddy Duck
<b>Weißkopf-Ruderente</b>	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	BD		S	White-headed Duck

**HÜHNERVÖGEL****ORDNUNG GALLIFORMES**

<b>Glatt- und Raufußhühner</b>	<b>Familie Phasianidae</b>					Pheasants and allies
<b>Haselhuhn</b>	<i>Tetraites bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	J	Hazel Grouse
„Westliches Haselhuhn“	<i>T. b. rhenanus</i>	(Kleinschmidt, O, 1917)		R1		
	<i>T. b. styriacus</i>	(Jordans & Schiebel, 1944)		R2		
	<i>T. b. rupestris</i>	(Brehm, CL, 1831)		R2		
<b>Auerhuhn</b>	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	A	R2	J	Western Capercaillie
	<i>T. u. crassirostris</i>	Brehm, CL, 1831				
<b>Birkhuhn</b>	<i>Lyrurus tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	J	Black Grouse
	<i>L. t. tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)				

<b>Alpenschneehuhn</b>	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1781)	A	R2	J	Rock Ptarmigan
	<i>L. m. helvetica</i>	(Thienemann, 1829)				
<b>Steinhuhn</b>	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	A	L1	j	Rock Partridge
	<i>A. g. saxatilis</i>	(Bechstein, 1805)				
<b>Rebhuhn</b>	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	J	Grey Partridge
	<i>P. p. perdix</i>	(Linnaeus, 1758)				
„Heiderebhuhn“	<i>P. p. sphagnetorum</i> †	(Altum, 1894)		0		
<b>Wachtel</b>	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Common Quail
	<i>C. c. coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Jagdfasan</b>	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	C1	N5	J	Common Pheasant
	<i>P. c. colchicus</i>	Linnaeus, 1758				

**SEETAUCHER****ORDNUNG GAVIIFORMES**

<b>Seetaucher</b>	<b>Familie Gaviidae</b>				Loons
<b>Sterntaucher</b>	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	A	ZW	Red-throated Loon
<b>Prachtaucher</b>	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	A	ZW	Black-throated Loon
	<i>G. a. arctica</i>	(Linnaeus, 1758)			
<b>Eistaucher</b>	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	A	zw	Common Loon
<b>Gebschnabeltaucher</b>	<i>Gavia adamsii</i>	(Gray, GR, 1859)	A	S	Yellow-billed Loon

**RÖHRENNASEN****ORDNUNG PROCELLARIIFORMES**

<b>Südsturmschwalben</b>	<b>Familie Oceanitidae</b>				Austral Storm Petrels
<b>Buntfuß-Sturmschwalbe</b>	<i>Oceanites oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)	A	s	Wilson's Storm Petrel
	<i>O. o. oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)			
<b>Albatrosse</b>	<b>Familie Diomedeidae</b>				Albatrosses
<b>Schwarzbrauenalbatros</b>	<i>Thalassarche melanophris</i>	(Temminck, 1828)	A	s	Black-browed Albatross
<b>Sturmschwalben</b>	<b>Familie Hydrobatidae</b>				Northern Storm Petrels
<b>Sturmschwalbe</b>	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	S	European Storm Petrel
	<i>H. p. pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)			
<b>Wellenläufer</b>	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	A	z	Leach's Storm Petrel
	<i>O. l. leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)			
<b>Sturmvögel</b>	<b>Familie Procellariidae</b>				Petrels, Shearwaters
<b>Eissturm Vogel</b>	<i>Fulmarus glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)	A	L1	JZW
	<i>F. g. glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)			S
	<i>F. g. auduboni</i>	Bonaparte, 1857			
<b>Sepiasturmtaucher</b>	<i>Calonectris diomedea</i>	(Scopoli, 1769)	B		Scopoli's Shearwater
<b>Corysturmtaucher</b>	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)	A	s	Cory's Shearwater
<b>Dunkelsturmtaucher</b>	<i>Ardenna grisea</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A	z	Sooty Shearwater

Kappensturmtaucher	<i>Ardenna gravis</i>	(O'Reilly, 1818)	A	s	Great Shearwater
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	(Brünnich, 1764)	A	S	Manx Shearwater
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Lowe, PR, 1921	A	S	Balearic Shearwater
Barolosturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	(Bonaparte, 1857)	A	s	Barolo Shearwater
Bulwersturmvogel	<i>Bulweria bulwerii</i>	(Jardine & Selby, 1828)	A	s	Bulwer's Petrel

**LAPPENTAUCHER**      **ORDNUNG PODICIPEDIFORMES**

Lappentaucher	<b>Familie Podicipedidae</b>					Grebes
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	A	N4	JZW	Little Grebe
	<i>T. r. ruficollis</i>	(Pallas, 1764)				
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)	A	s		Pied-billed Grebe
	<i>P. p. podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)				
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	A	R3	JZW	Red-necked Grebe
	<i>P. g. grisegena</i>	(Boddaert, 1783)				
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Great Crested Grebe
	<i>P. c. cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)				
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	0	ZW	Horned Grebe
	<i>P. a. auritus</i>	(Linnaeus, 1758)				
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Brehm, CL, 1831	A	N3	JZW	Black-necked Grebe
	<i>P. n. nigricollis</i>	Brehm, CL, 1831				

**FLAMINGOS**      **ORDNUNG PHOENICOPTERIFORMES**

Flamingos	<b>Familie Phoenicopteridae</b>					Flamingos
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811	A	L1E	z	Greater Flamingo

**STORCHENVÖGEL**      **ORDNUNG CICONIIFORMES**

Störche	<b>Familie Ciconiidae</b>					Storks
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N2	Z	Black Stork
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	ZJ	White Stork
	<i>C. c. ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)				

**SCHREIT- UND PELIKAN-VÖGEL**      **ORDNUNG PELECANIFORMES**

Ibisse	<b>Familie Threskiornithidae</b>					Ibises, Spoonbills
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	S		Glossy Ibis
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	A	R2	Z	Eurasian Spoonbill
	<i>P. l. leucorodia</i>	Linnaeus, 1758				

<b>Reiher</b>	<b>Familie Ardeidae</b>					<b>Herons, Bitterns</b>
<b>Rohrdommel</b>	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R2	JZW	Eurasian Bittern
	<i>B. s. stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Zwergdommel</b>	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	R2	Z	Little Bittern
	<i>I. m. minutus</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Nachtreiher</b>	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L1	z	Black-crowned Night Heron
	<i>N. n. nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Rallenreiher</b>	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	A		S	Squacco Heron
<b>Kuhreiher</b>	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L1E	j	Western Cattle Egret
<b>Graureiher</b>	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Grey Heron
	<i>A. c. cinerea</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Purpureireiher</b>	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	A	L1	z	Purple Heron
	<i>A. p. purpurea</i>	Linnaeus, 1766				
<b>Silberreiher</b>	<i>Ardea alba</i>	Linnaeus, 1758	A	L1	JZW	Great Egret
	<i>A. a. alba</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Seidenreiher</b>	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	A	V	z	Little Egret
	<i>E. g. garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Pelikane</b>	<b>Familie Pelecanidae</b>					<b>Pelicans</b>
<b>Rosapelikan</b>	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	BD		S	Great White Pelican
<b>Krauskopfpelikan</b>	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832	A		s	Dalmatian Pelican
<b>RUDERFÜSSER</b>	<b>ORDNUNG SULIFORMES</b>					
<b>Tölpel</b>	<b>Familie Sulidae</b>					<b>Gannets, Boobies</b>
<b>Basstölpel</b>	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L2	JZW	Northern Gannet
<b>Weißbauchtölpel</b>	<i>Sula leucogaster</i>	(Boddaert, 1783)	A		s	Brown Booby
	<i>S. l. leucogaster</i> (?)	(Boddaert, 1783)				
<b>Scharben</b>	<b>Familie Phalacrocoracidae</b>					<b>Cormorants, Shags</b>
<b>Zwergscharbe</b>	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	(Pallas, 1773)	A		S	Pygmy Cormorant
<b>Krähenscharbe</b>	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)	A		j	European Shag
	<i>P. a. aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)				
<b>Kormoran</b>	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Great Cormorant
„Atlantischer Kormoran“	<i>P. c. carbo</i>	(Linnaeus, 1758)			ZW	
	<i>P. c. sinensis</i>	(Staunton, 1796)				
<b>GREIFVÖGEL</b>	<b>ORDNUNG ACCIPITRIFORMES</b>					
<b>Fischadler</b>	<b>Familie Pandionidae</b>					<b>Ospreys</b>
<b>Fischadler</b>	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R2	Z	Western Osprey
	<i>P. h. haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)				

Habichtverwandte	Familie Accipitridae				Kites, Hawks and Eagles	
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i> <i>E. c. caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789) (Desfontaines, 1789)	A	S	Black-winged Kite	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i> <i>G. b. barbatus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	BE	S	Bearded Vulture	
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i> <i>N. p. percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	S	Egyptian Vulture	
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	European Honey Buzzard	
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i> <i>G. f. fulvus</i>	(Hablitzl, 1783) (Hablitzl, 1783)	A	S	Griffon Vulture	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)	BE	s	Cinereous Vulture	
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i> <i>C. g. gallicus</i>	(Gmelin, JF, 1788) (Gmelin, JF, 1788)	A	0 (B)	Short-toed Snake Eagle	
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	(Brehm, CL, 1831)	A	R1	Z	Lesser Spotted Eagle
Schelladler	<i>Clanga clanga</i>	(Pallas, 1811)	A	V	S	Greater Spotted Eagle
Zwergadler	<i>Hieraetus pennatus</i>	(Gmelin, JF, 1788)	A	V	S	Booted Eagle
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i> <i>A. n. orientalis</i>	Hodgson, 1833 Cabanis, 1854	A		s	Steppe Eagle
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	Savigny, 1809	A		s	Eastern Imperial Eagle
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i> <i>A. c. chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	R1	J	Golden Eagle
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i> <i>A. f. fasciata</i>	Vieillot, 1822 Vieillot, 1822	A		s	Bonelli's Eagle
Sperber	<i>Accipiter nisus</i> <i>A. n. nisus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Eurasian Sparrowhawk
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i> <i>A. g. buteooides</i> <i>A. g. gentilis</i>	(Linnaeus, 1758) (Menzbier, 1882) (Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Northern Goshawk
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i> <i>C. a. aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	N3	Z	Western Marsh Harrier
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	R1	JZW	Hen Harrier
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	(Gmelin, SG, 1770)	A	V	z	Pallid Harrier
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N2	Z	Montagu's Harrier
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i> <i>M. m. milvus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Red Kite
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i> <i>M. m. migrans</i>	(Boddaert, 1783) (Boddaert, 1783)	A	N3	Z	Black Kite
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i> <i>H. a. albicilla</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	R2	JW	White-tailed Eagle
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i> <i>B. l. lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763) (Pontoppidan, 1763)	A	V	W	Rough-legged Buzzard
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i> <i>B. r. rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829) (Cretzschmar, 1829)	A		S	Long-legged Buzzard
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i> <i>B. b. buteo</i> <i>B. b. vulpinus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) (Gloger, 1833)	A	N4	JZW	Common Buzzard
„Falkenbussard“					s	

**TRAPPEN****ORDNUNG OTIDIIFORMES****Trappen****Großtrappe****Familie Otididae***Otis tarda* Linnaeus, 1758

A

L1

J

**Bustards***O. t. tarda* Linnaeus, 1758**Steppenkragentrappe***Chlamydotis macqueenii*

(Gray, JE, 1832)

A

s

**Macqueen's Bustard****Zwergrappe***Tetrax tetrax*

(Linnaeus, 1758)

A

0 (B)

S

**Little Bustard****KRANICHVÖGEL****ORDNUNG GRUIFORMES****Rallen****Wasserralle****Familie Rallidae***Rallus aquaticus*

(Linnaeus, 1758)

A

N4

JZW

**Rails, Crakes and Coots***R. a. aquaticus* Linnaeus, 1758**Wachtelkönig***Crex crex*

(Linnaeus, 1758)

A

N3

Z

**Corn Crake****Kleinsumpfhuhn***Porzana parva*

(Scopoli, 1769)

A

R2

Z

**Little Crake****Zwergsumpfhuhn***Porzana pusilla*

(Pallas, 1776)

A

L1

S

**Baillon's Crake***P. p. intermedia* (Hermann, 1804)**Tüpfelsumpfhuhn***Porzana porzana*

(Linnaeus, 1766)

A

N3

Z

**Spotted Crake****Purpurhuhn***Porphyrio porphyrio*

(Linnaeus, 1758)

BD

s

**Western Swamphen****Graukopf-Purpurhuhn***Porphyrio poliocephalus*

(Latham, 1801)

A

s

**Grey-headed Swamphen***P. p. seistanicus* Zarudny & Härm, 1911**Bronzesultanshuhn***Porphyrio alleni*

(Thomson, 1842)

BD

s

**Allen's Gallinule****Teichhuhn***Gallinula chloropus*

(Linnaeus, 1758)

A

N4

JZW

**Common Moorhen***G. c. chloropus* (Linnaeus, 1758)**Blässhuhn***Fulica atra*

(Linnaeus, 1758)

A

N4

JZW

**Eurasian Coot***F. a. atra* Linnaeus, 1758**Kraniche****Familie Gruidae****Kanadakranich***Antigone canadensis*

(Linnaeus, 1758)

A

s

**Cranes***A. c. canadensis* (Linnaeus, 1758)**Jungfernkranich***Grus virgo*

(Linnaeus, 1758)

BD

s

**Demoiselle Crane****Kranich***Grus grus*

(Linnaeus, 1758)

A

N3

JZW

**Common Crane****WAT-, ALKEN- UND MÖWENVÖGEL****ORDNUNG CHARADRIIFORMES****Triele****Familie Burhinidae****Triel***Burhinus oedicnemus*

(Linnaeus, 1758)

A

L1

z

**Stone-curlews***B. o. oedicnemus* (Linnaeus, 1758)**Eurasian Stone-curlew****Austernfischer****Familie Haematopodidae****Austernfischer***Haematopus ostralegus*

Linnaeus, 1758

A

R4

JZW

**Oystercatchers***H. o. ostralegus* Linnaeus, 1758**Eurasian Oystercatcher**

<b>Säbelschnäblerverwandte</b>	<b>Familie Recurvirostridae</b>					<b>Stilts, Avocets</b>
<b>Stelzenläufer</b>	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N1	z	Black-winged Stilt
<b>Säbelschnäbler</b>	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Linnaeus, 1758	A	R3	JZW	Pied Avocet
<b>Regenpfeiferverwandte</b>	<b>Familie Charadriidae</b>					<b>Plovers</b>
<b>Kiebitz</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Northern Lapwing
<b>Steppenkiebitz</b>	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)	A		S	Sociable Lapwing
<b>Weißschwanzkiebitz</b>	<i>Vanellus leucurus</i>	(Lichtenstein, MHC, 1823)	A		S	White-tailed Lapwing
<b>Goldregenpfeifer</b>	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L1	Z	European Golden Plover
<b>Tundra-Goldregenpfeifer</b>	<i>Pluvialis fulva</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A		S	Pacific Golden Plover
<b>Prärie-Goldregenpfeifer</b>	<i>Pluvialis dominica</i>	(Statius Müller, 1776)	A		S	American Golden Plover
<b>Kiebitzregenpfeifer</b>	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	A		Z	Grey Plover
	<i>P. s. squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Sandregenpfeifer</b>	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	A	R3	Z	Common Ringed Plover
	<i>C. h. hiaticula</i>	Linnaeus, 1758				
„Tundra-Sandregenpfeifer“	<i>C. h. tundrae</i>	(Lowe, PR, 1915)			Z	
<b>Flussregenpfeifer</b>	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	A	N3	Z	Little Ringed Plover
	<i>C. d. curonicus</i>	Gmelin, JF, 1789				
<b>Seeregenpfeifer</b>	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	A	R2	Z	Kentish Plover
	<i>C. a. alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Wüstenregenpfeifer</b>	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Lesson, 1826	A		S	Greater Sand Plover
	<i>C. l. columbinus</i> (?)	Wagler, 1829			s	
	<i>C. l. scythicus</i> (?)	Carlos, Roselaar & Voisin, 2012			s	
<b>Wermutregenpfeifer</b>	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pallas, 1773	B			Caspian Plover
<b>Mornellregenpfeifer</b>	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	A	V (B)	Z	Eurasian Dotterel
<b>Schnepfenverwandte</b>	<b>Familie Scolopacidae</b>					<b>Sandpipers, Snipes</b>
<b>Prärieläufer</b>	<i>Bartramia longicauda</i>	(Bechstein, 1812)	B			Upland Sandpiper
<b>Regenbrachvogel</b>	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	VE	Z	Whimbrel
	<i>N. p. phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Dünnschnabel-Brachvogel</b>	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	B			Slender-billed Curlew
<b>Brachvogel</b>	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	Z	Eurasian Curlew
	<i>N. a. arquata</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Pfuhlschnepfe</b>	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	A		Z	Bar-tailed Godwit
	<i>L. l. lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Uferschnepfe</b>	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	Z	Black-tailed Godwit
„Isländische Uferschnepfe“	<i>L. l. islandica</i>	Brehm, CL, 1831			zw	
	<i>L. l. limosa</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Steinwälzer</b>	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	A	0	ZW	Ruddy Turnstone
	<i>A. i. interpres</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Anadyrknett</b>	<i>Calidris tenuirostris</i>	(Horsfield, 1821)	Ao		s	Great Knot
<b>Knutt</b>	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		ZW	Red Knot
	<i>C. c. canutus</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>C. c. islandica</i>	(Linnaeus, 1767)				

<b>Kampfläufer</b>	<i>Calidris pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R1	Z	Ruff
<b>Sumpfläufer</b>	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	A		Z	Broad-billed Sandpiper
	<i>C. f. falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)				
<b>Spitzschwanz-Strandläufer</b>	<i>Calidris acuminata</i>	(Horsfield, 1821)	A		s	Sharp-tailed Sandpiper
<b>Bindenstrandläufer</b>	<i>Calidris himantopus</i>	(Bonaparte, 1826)	A		s	Stilt Sandpiper
<b>Sichelstrandläufer</b>	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	A		Z	Curlew Sandpiper
<b>Temminckstrandläufer</b>	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	A		Z	Temminck's Stint
<b>Langzehen-Strandläufer</b>	<i>Calidris subminuta</i>	(Middendorff, 1853)	A		s	Long-toed Stint
<b>Rotkehl-Strandläufer</b>	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Ao		s	Red-necked Stint
<b>Sanderling</b>	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	A		ZW	Sanderling
	<i>C. a. alba</i>	(Pallas, 1764)				
<b>Alpenstrandläufer</b>	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R1	ZW	Dunlin
„Kleiner Alpenstrandläufer“	<i>C. a. schinzii</i>	(Brehm, CL & Schilling, 1822)		R1	Z	
	<i>C. a. alpina</i>	(Linnaeus, 1758)			ZW	
<b>Meerstrandläufer</b>	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	A		ZW	Purple Sandpiper
<b>Bairdstrandläufer</b>	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)	A		S	Baird's Sandpiper
<b>Zwergstrandläufer</b>	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	A		Z	Little Stint
<b>Wiesenstrandläufer</b>	<i>Calidris minutilla</i>	(Vieillot, 1819)	A		s	Least Sandpiper
<b>Weißbürtzel-Strandläufer</b>	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)	A		S	White-rumped Sandpiper
<b>Grasläufer</b>	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	A		S	Buff-breasted Sandpiper
<b>Graubrust-Strandläufer</b>	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)	A		z	Pectoral Sandpiper
<b>Sandstrandläufer</b>	<i>Calidris pusilla</i>	(Linnaeus, 1766)	A		s	Semipalmated Sandpiper
<b>Tundraschlammmläufer</b>	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1822)	A		S	Long-billed Dowitcher
<b>Moorschlammläufer</b>	<i>Limnodromus griseus</i>	(Gmelin, JF, 1789)	Ao		s	Short-billed Dowitcher
	<i>L. g. griseus</i> (?)	(Gmelin, JF, 1789)				
<b>Waldschnepfe</b>	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Eurasian Woodcock
<b>Zwergschnepfe</b>	<i>Lymnocryptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	A	V (B)	ZW	Jack Snipe
<b>Doppelschnepfe</b>	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	A	0 (B)	S	Great Snipe
<b>Bekassine</b>	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	ZW	Common Snipe
	<i>G. g. faeroensis</i>	(Brehm, CL, 1831)			s (B)	
	<i>G. g. gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Terekwasserläufer</b>	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)	A		S	Terek Sandpiper
<b>Wilsonwassertreter</b>	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)	A		S	Wilson's Phalarope
<b>Odinshühnchen</b>	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		Z	Red-necked Phalarope
<b>Thorshühnchen</b>	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	A		z	Red Phalarope
<b>Flussuferläufer</b>	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N2	Z	Common Sandpiper
<b>Drosseluferläufer</b>	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)	A		S	Spotted Sandpiper
<b>Waldwasserläufer</b>	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	A	R3	ZW	Green Sandpiper
<b>Gebschenkel</b>	<i>Tringa flavipes</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A		S	Lesser Yellowlegs
<b>Rotschenkel</b>	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	JZW	Common Redshank
„Isländischer Rotschenkel“	<i>T. t. robusta</i>	(Schiöler, 1919)			ZW	
	<i>T. t. totanus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Teichwasserläufer</b>	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	A	V	z	Marsh Sandpiper
<b>Bruchwasserläufer</b>	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	A	L1	Z	Wood Sandpiper

Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	A	Z	Spotted Redshank	
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	A	Z	Common Greenshank	
Brachschwalbenverwandte	<b>Familie Glareolidae</b>				Courfers, Pratincoles	
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	A	s	Cream-colored Courser	
	<i>C. c. cursor</i>	(Latham, 1787)				
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	A	S	Collared Pratincole	
	<i>G. p. pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)				
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	Fischer von Waldheim, 1842	A	V	Black-winged Pratincole	
Möwenverwandte	<b>Familie Laridae</b>				Gulls, Terns	
Noddi	<i>Anous stolidus</i>	(Linnaeus, 1758)	B		Brown Noddy	
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L3	JZW	Black-legged Kittiwake
	<i>R. t. tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)				
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	A	S	Ivory Gull	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	A	z	Sabine's Gull	
Dünnschnabelmöwe	<i>Chroicocephalus genei</i>	(Brème, 1839)	A	s	Slender-billed Gull	
Bonapartemöwe	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	(Ord, 1815)	A	s	Bonaparte's Gull	
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	N5	JZW	Black-headed Gull
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	A	L1	Z	Little Gull
Rosenmöwe	<i>Rhodostethia rosea</i>	(MacGillivray, W, 1824)	A	S	Ross's Gull	
Aztekenmöwe	<i>Leucophaeus atricilla</i>	(Linnaeus, 1758)	A	S	Laughing Gull	
	<i>L. a. megalopterus</i>	(Bruch, 1855)				
Präriemöwe	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	(Wagler, 1831)	A	S	Franklin's Gull	
Korallenmöwe	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	(Payraudeau, 1826)	A	S	Audouin's Gull	
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	(Temminck, 1820)	A	N2	Zw	Mediterranean Gull
Fischmöwe	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	(Pallas, 1773)	A	S	Pallas's Gull	
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	A	R4	JZW	Mew Gull
	<i>L. c. canus</i>	Linnaeus, 1758				
	<i>L. c. heinei</i>	Homeyer, 1853			W	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815	A	S	Ring-billed Gull	
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	A	R1	JZW	Great Black-backed Gull
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767	A	w		Glaucoous Gull
	<i>L. h. hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767				
Polarmöwe	<i>Larus glaucopterus</i>	Meyer, B, 1822	A	w		Iceland Gull
	<i>L. g. glaucopterus</i>	Meyer, B, 1822				
„Kumlienmöwe“	<i>L. g. kumlieni</i>	Brewster, 1883			s	
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	A	R4	JZW	European Herring Gull
	<i>L. a. argenteus</i>	Brehm, CL & Schilling, 1822				
	<i>L. a. argentatus</i>	Pontoppidan, 1763				
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	Coues, 1862	A	s	American Herring Gull	
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	A	R1	ZW	Caspian Gull
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, JF, 1840	A	R2	ZW	Yellow-legged Gull
	<i>L. m. michahellis</i>	Naumann, JF, 1840				

<b>Heringsmöwe</b>	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	A	R4	ZW	Lesser Black-backed Gull
„Westliche Heringsmöwe“	<i>L. f. graellsii</i>	Brehm, AE, 1857			z	
	<i>L. f. intermedius</i>	Schiøler, 1922		R4	ZW	
„Baltische Heringsmöwe“	<i>L. f. fuscus</i>	Linnaeus, 1758		0	Z	
„Tundramöwe“	<i>L. f. heuglini</i>	Bree, 1876			S	
<b>Lachseeschwalbe</b>	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A	L1	z	Gull-billed Tern
	<i>G. n. nilotica</i>	(Gmelin, JF, 1789)				
<b>Raubseeschwalbe</b>	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	A	L1	Z	Caspian Tern
<b>Rüppellseeschwalbe</b>	<i>Thalasseus bengalensis</i>	(Lesson, 1831)	A		s	Lesser Crested Tern
	<i>T. b. bengalensis</i>	(Lesson, 1831)				
<b>Brandseeschwalbe</b>	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Latham, 1787)	A	R3	Z	Sandwich Tern
<b>Schmuckseeschwalbe</b>	<i>Thalasseus elegans</i>	(Gambel, 1849)	A		s	Elegant Tern
<b>Zwergseeschwalbe</b>	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	A	R2	Z	Little Tern
	<i>S. a. albifrons</i>	(Pallas, 1764)				
<b>Zügelseeschwalbe</b>	<i>Onychoprion anaethetus</i>	(Scopoli, 1786)	A		s	Bridled Tern
	<i>O. a. anaethetus</i>	(Scopoli, 1786)				
<b>Rußseeschwalbe</b>	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	A		s	Sooty Tern
	<i>O. f. fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Rosenseeschwalbe</b>	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813	A	0 (B)	S	Roseate Tern
	<i>S. d. dougallii</i>	Montagu, 1813				
<b>Flusseeschwalbe</b>	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	Z	Common Tern
	<i>S. h. hirundo</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Küstenseeschwalbe</b>	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	A	R3	Z	Arctic Tern
<b>Weißbart-Seeschwalbe</b>	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	A	R1	z	Whiskered Tern
	<i>C. h. hybrida</i>	(Pallas, 1811)				
<b>Weißflügel-Seeschwalbe</b>	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	A	R1	z	White-winged Tern
<b>Trauerseeschwalbe</b>	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R2	Z	Black Tern
	<i>C. n. niger</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Raubmöwen</b>	<b>Familie Stercorariidae</b>					<b>Skuas</b>
<b>Skua</b>	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	A		z	Great Skua
<b>Spatelraubmöwe</b>	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	A		z	Pomarine Jaeger
<b>Schmarotzerraubmöwe</b>	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		Z	Parasitic Jaeger
<b>Falkenraubmöwe</b>	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	A		z	Long-tailed Jaeger
	<i>S. l. longicaudus</i>	Vieillot, 1819				
<b>Alke</b>	<b>Familie Alcidae</b>					<b>Auks</b>
<b>Krabbenstaucher</b>	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)	A		Zw	Little Auk
	<i>A. a. alle</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Dickschnabellumme</b>	<i>Uria lomvia</i>	(Linnaeus, 1758)	A		s	Thick-billed Murre
	<i>U. l. lomvia</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Trottellumme</b>	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	A	L3	JZW	Common Murre
	<i>U. a. aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)			W	
	<i>U. a. hyperborea</i>	Salomonsen, 1932			s	
	<i>U. a. albionis</i>	Witherby, 1923		L3	J	

<b>Tordalk</b>	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	A	L1	JZW	Razorbill
	<i>A. t. torda</i>	Linnaeus, 1758			ZW	
	<i>A. t. islandica</i>	Brehm, CL, 1831				
<b>Gryllteiste</b>	<i>Cephus grylle</i>	(Linnaeus, 1758)	A	V	zw	Black Guillemot
	<i>C. g. arcticus</i>	(Brehm, CL, 1824)			w	
	<i>C. g. grylle</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Papageitaucher</b>	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	A	0 (B)	Z	Atlantic Puffin
<b>FLUGHÜHNER</b>						
<b>ORDNUNG PTEROCLIFORMES</b>						
<b>Flughühner</b>	<b>Familie Pteroclidae</b>					Sandgrouse
<b>Steppenflughuhn</b>	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	(Pallas, 1773)	A	V (B)	s	Pallas's Sandgrouse
<b>Sandflughuhn</b>	<i>Pterocles orientalis</i>	(Linnaeus, 1758)	B			Black-bellied Sandgrouse
	<i>P. o. arenarius</i>	(Pallas, 1775)				
<b>TAUBEN</b>						
<b>ORDNUNG COLUMBIIFORMES</b>						
<b>Tauben</b>	<b>Familie Columbidae</b>					Pigeons, Doves
<b>Straßentaube</b>	<i>Columba livia f. domestica</i>	Gmelin, JF, 1789	C4	N5	J	Feral Rock Dove
<b>Hohltaube</b>	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	Z	Stock Dove
	<i>C. o. oenas</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Ringeltaube</b>	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW	Common Wood Pigeon
	<i>C. p. palumbus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Turteltaube</b>	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	European Turtle Dove
	<i>S. t. turtur</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Orientturteltaube</b>	<i>Streptopelia orientalis</i>	(Latham, 1790)	A		s	Oriental Turtle Dove
	<i>S. o. meena</i>	(Sykes, 1832)				
<b>Türkentaube</b>	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)	A	N5	J	Eurasian Collared Dove
	<i>S. d. decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)				
<b>Carolinataube</b>	<i>Zenaida macroura</i>	(Linnaeus, 1758)	A		s	Mourning Dove
	<i>Z. m. carolinensis (?)</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>KUCKUCKE</b>						
<b>ORDNUNG CUCULIFORMES</b>						
<b>Kuckucke</b>	<b>Familie Cuculidae</b>					Cuckoos
<b>Häherkuckuck</b>	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	A		s	Great Spotted Cuckoo
<b>Schwarzschnabelkuckuck</b>	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	(Wilson, A, 1811)	A		s	Black-billed Cuckoo
<b>Kuckuck</b>	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	Z	Common Cuckoo
	<i>C. c. canorus</i>	Linnaeus, 1758				

**EULEN****ORDNUNG STRIGIFORMES**

<b>Schleiereulen</b>	<b>Familie Tytonidae</b>					<b>Barn Owls</b>
<b>Schleiereule</b>	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	A	N4	J	Western Barn Owl
	<i>T. a. alba</i>	(Scopoli, 1769)			s	
	<i>T. a. guttata</i>	(Brehm, CL, 1831)				
<b>Eulen</b>	<b>Familie Strigidae</b>					<b>Owls</b>
<b>Zwergohreule</b>	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	A	V	S	Eurasian Scops Owl
	<i>O. s. scops</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Schneeeule</b>	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		S	Snowy Owl
<b>Uhu</b>	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	J	Eurasian Eagle-Owl
	<i>B. b. bubo</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Waldkauz</b>	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	J	Tawny Owl
	<i>S. a. aluco</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Habichtskauz</b>	<i>Strix uralensis</i>	Pallas, 1771	BE	L1E	j	Ural Owl
	<i>S. u. macroura</i>	Wolf, 1810				
	<i>S. u. liturata</i>	Lindroth, 1788			s (B)	
<b>Sperbereule</b>	<i>Surnia ulula</i>	(Linnaeus, 1758)	A		S	Northern Hawk-Owl
	<i>S. u. ulula</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Sperlingskauz</b>	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	J	Eurasian Pygmy Owl
	<i>G. p. passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Steinkauz</b>	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	A	N3	J	Little Owl
	<i>A. n. noctua</i>	(Scopoli, 1769)				
<b>Raufußkauz</b>	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	J	Boreal Owl
	<i>A. f. funereus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Waldoahreule</b>	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Long-eared Owl
	<i>A. o. otus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Sumpföhreule</b>	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	A	R1	ZW	Short-eared Owl
	<i>A. f. flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)				

**SCHWALMVÖGEL****ORDNUNG CAPRIMULGIFORMES**

<b>Nachtschwalben</b>	<b>Familie Caprimulgidae</b>					<b>Nightjars</b>
<b>Nachtschwalbe</b>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	Z	European Nightjar
	<i>C. e. europaeus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Pharaonennachtschwalbe</b>	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Lichtenstein, MHC, 1823	B			Egyptian Nightjar
	<i>C. a. aegyptius</i>	Lichtenstein, MHC, 1823				

SEGLER		ORDNUNG APODIFORMES				
<b>Segler</b>		<b>Familie Apodidae</b>				
Alpensegler		<i>Tachymarptis melba</i>	(Linnaeus, 1758)	A	L2	Z
		<i>T. m. melba</i>	(Linnaeus, 1758)			
<b>Mauersegler</b>		<i>Apus apus</i>				
		<i>A. a. apus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z
<b>Fahlsegler</b>		<i>Apus pallidus</i>				
		<i>A. p. brehmorum (?)</i>	(Shelley, 1870)	A		S
<b>Pazifiksegler</b>		<i>Apus pacificus</i>				
		<i>A. p. pacificus</i>	(Latham, 1801)	A		s
<b>Haussegler</b>		<i>Apus affinis</i>				
		<i>A. a. galileensis (?)</i>	(Gray, JE, 1830)	A		s
			(Antinori, 1855)			
RACKENVÖGEL		ORDNUNG CORACIIFORMES				
<b>Racken</b>		<b>Familie Coraciidae</b>				
Blauracke		<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758	A	0	S
		<i>C. g. garrulus</i>	Linnaeus, 1758			
<b>Eisvögel</b>		<b>Familie Alcedinidae</b>				
Eisvogel		<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW
		<i>A. a. ispida</i>	Linnaeus, 1758			
<b>Spinte</b>		<b>Familie Meropidae</b>				
Blauwangenspint		<i>Merops persicus</i>	Pallas, 1773	A		S
		<i>M. p. persicus</i>	Pallas, 1773			
Bienenfresser		<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	Z
HOPF- UND HORNVÖGEL		ORDNUNG BUCEROTIFORMES				
<b>Wiedehopfe</b>		<b>Familie Upupidae</b>				
Wiedehopf		<i>Upupa epops</i>	Linnaeus, 1758	A	R2	Z
		<i>U. e. epops</i>	Linnaeus, 1758			
SPECHTVÖGEL		ORDNUNG PICIFORMES				
<b>Spechte</b>		<b>Familie Picidae</b>				
Wendehals		<i>Jynx torquilla</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	Z
		<i>J. t. torquilla</i>	Linnaeus, 1758			

Swifts

Alpine Swift

Common Swift

Pallid Swift

Pacific Swift

Little Swift

Rollers

European Roller

Kingfishers

Common Kingfisher

Bee-eaters

Blue-cheeked Bee-eater

European Bee-eater

Hoopes

Eurasian Hoopoe

Woodpeckers

Eurasian Wryneck

<b>Dreizehenspecht</b>	<i>Picoides tridactylus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R2	J	Eurasian Three-toed Woodpecker
	<i>P. t. alpinus</i>	Brehm, CL, 1831				
<b>Mittelspecht</b>	<i>Dendrocoptes medius</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	J	Middle Spotted Woodpecker
	<i>D. m. medius</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Kleinspecht</b>	<i>Dryobates minor</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JW	Lesser Spotted Woodpecker
	<i>D. m. minor</i>	(Linnaeus, 1758)			S	
	<i>D. m. hortorum</i>	(Brehm, CL, 1831)				
<b>Blutspecht</b>	<i>Dendrocopos syriacus</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	A		s	Syrian Woodpecker
	<i>D. s. syriacus</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)				
<b>Buntspecht</b>	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW	Great Spotted Woodpecker
	<i>D. m. major</i>	(Linnaeus, 1758)		N5	J	
	<i>D. m. pinetorum</i>	(Brehm, CL, 1831)			ZW	
<b>Weißrückenspecht</b>	<i>Dendrocopos leucotos</i>	(Bechstein, 1802)	A	R2	J	White-backed Woodpecker
	<i>D. l. leucotos</i>	(Bechstein, 1802)				
<b>Schwarzspecht</b>	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	J	Black Woodpecker
	<i>D. m. martius</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Grünspecht</b>	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	J	European Green Woodpecker
	<i>P. v. viridis</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Grauspecht</b>	<i>Picus canus</i>	Gmelin, JF, 1788	A	N4	J	Grey-headed Woodpecker
	<i>P. c. canus</i>	Gmelin, JF, 1788				

**FALKEN****ORDNUNG FALCONIFORMES**

<b>Falken</b>	<b>Familie Falconidae</b>					Falcons
<b>Rötelfalke</b>	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, JG, 1818	A		S	Lesser Kestrel
<b>Turmfalke</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Common Kestrel
	<i>F. t. tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Rotfußfalke</b>	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766	A	V	z	Red-footed Falcon
<b>Eleonorenfalke</b>	<i>Falco eleonorae</i>	Gené, 1839	A		s	Eleonora's Falcon
<b>Merlin</b>	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	A		ZW	Merlin
	<i>F. c. subaesalon</i>	Brehm, CL, 1827			s	
	<i>F. c. aesalon</i>	Tunstall, 1771				
<b>Baumfalke</b>	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	Z	Eurasian Hobby
	<i>F. s. subbuteo</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Würgfalke</b>	<i>Falco cherrug</i>	Gray, JE, 1834	A	0	S	Saker Falcon
	<i>F. c. cherrug</i>	Gray, JE, 1834				
<b>Gerfalke</b>	<i>Falco rusticolus</i>	Linnaeus, 1758	A		S	Gyrfalcon
<b>Wanderfalke</b>	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	A	N3	JZW	Peregrine Falcon
	<i>F. p. peregrinus</i>	Tunstall, 1771				
	<i>F. p. calidus</i>	Latham, 1790			z	

PAPAGEIEN		ORDNUNG PSITTACIFORMES				
<b>Altweltpapageien</b>		<b>Familie Psittaculidae</b>				
<b>Halsbandsittich</b>		<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	C1	R3	J
		<i>P. k. borealis</i>	(Neumann, 1915)			
<b>SPERLINGSVÖGEL</b>		ORDNUNG PASSERIFORMES				
<b>Würger</b>		<b>Familie Laniidae</b>				
<b>Braunwürger</b>		<i>Lanius cristatus</i>	Linnaeus, 1758	A	s	Brown Shrike
		<i>L. c. cristatus</i>	Linnaeus, 1758			
<b>Neuntöter</b>		<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	Z
<b>Isabellwürger</b>		<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833	A	S	Red-backed Shrike
		<i>L. i. isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833			Isabelline Shrike
<b>Rotschwanzwürger</b>		<i>Lanius phoenicuroides</i>	(Schalow, 1875)	A	s	Red-tailed Shrike
<b>Schwarzstirnwürger</b>		<i>Lanius minor</i>	Gmelin, JF, 1788	A	0	S
<b>Raubwürger</b>		<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	A	N3	JZW
		<i>L. e. excubitor</i>	Linnaeus, 1758			Great Grey Shrike
		<i>L. e. homeyeri</i>	Cabanis, 1873		s (B)	
<b>Rotkopfwürger</b>		<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	A	0	z
		<i>L. s. senator</i>	Linnaeus, 1758			Woodchat Shrike
<b>Maskenwürger</b>		<i>Lanius nubicus</i>	Lichtenstein, MHC, 1823	A	s	Masked Shrike
<b>Vireos</b>		<b>Familie Vireonidae</b>				
<b>Gelbkehlvireo</b>		<i>Vireo flavifrons</i>	Vieillot, 1808	Ao	s	Yellow-throated Vireo
<b>Rotaugenvireo</b>		<i>Vireo olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	s	Red-eyed Vireo
		<i>V. o. olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)			
<b>Pirole</b>		<b>Familie Oriolidae</b>				
<b>Pirol</b>		<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z
						Eurasian Golden Oriole
<b>Krähenverwandte</b>		<b>Familie Corvidae</b>				
<b>Eichelhäher</b>		<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW
		<i>G. g. glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)			Eurasian Jay
<b>Elster</b>		<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	J
		<i>P. p. pica</i>	(Linnaeus, 1758)			Eurasian Magpie
<b>Tannenhäher</b>		<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	JZW
„Sibirischer Tannenhäher“		<i>N. c. caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)			
		<i>N. c. macrorhynchos</i>	Brehm, CL, 1823			Spotted Nutcracker
<b>Alpenkrähe</b>		<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)	B		Red-billed Chough
		<i>P. p. erythroramphos</i>	(Vieillot, 1817)			

<b>Alpendohle</b>	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	R2	J	Alpine Chough
	<i>P. g. graculus</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Dohle</b>	<i>Coloeus monedula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW	Western Jackdaw
	<i>C. m. monedula</i>	(Linnaeus, 1758)			W	
	<i>C. m. spermologus</i>	(Vieillot, 1817)		N5	J	
„Halsbanddohle“	<i>C. m. soemmerringii</i>	(Fischer von Waldheim, 1811)			w	
<b>Saatkrähe</b>	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Rook
	<i>C. f. frugilegus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Rabenkrähe</b>	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	A	R5	JZW	Carriion Crow
	<i>C. c. corone</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Nebelkrähe</b>	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	A	R4	JZW	Hooded Crow
	<i>C. c. cornix</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Kolkrabe</b>	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	J	Northern Raven
	<i>C. c. corax</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Seidenschwänze</b>	<b>Familie Bombycillidae</b>					<b>Waxwings</b>
<b>Seidenschwanz</b>	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		ZW	Bohemian Waxwing
	<i>B. g. garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Meisen</b>	<b>Familie Paridae</b>					<b>Tits</b>
<b>Tannenmeise</b>	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	Coal Tit
	<i>P. a. ater</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Haubenmeise</b>	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	J	European Crested Tit
	<i>L. c. mitratus</i>	(Brehm, CL, 1831)				
<b>Sumpfmeise</b>	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	J	Marsh Tit
	<i>P. p. palustris</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Weidenmeise</b>	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	A	N5	J	Willow Tit
	<i>P. m. rhenanus</i>	(Kleinschmidt, O, 1900)		R4		
„Alpenmeise“	<i>P. m. montanus</i>	(Conrad, 1827)		R4		
	<i>P. m. salicarius</i>	(Brehm, CL, 1831)		R4		
<b>Blaumeise</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	Eurasian Blue Tit
	<i>C. c. caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Lasurmeise</b>	<i>Cyanistes cyanus</i>	(Pallas, 1770)	A		s	Azure Tit
	<i>C. c. cyanus</i>	(Pallas, 1770)				
<b>Kohlmeise</b>	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW	Great Tit
	<i>P. m. major</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Beutelmeisen</b>	<b>Familie Remizidae</b>					<b>Penduline Tits</b>
<b>Beutelmeise</b>	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	Z	Eurasian Penduline Tit
	<i>R. p. pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Bartmeisen</b>	<b>Familie Panuridae</b>					<b>Bearded Reedling</b>
<b>Bartmeise</b>	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	JZ	Bearded Reedling
	<i>P. b. biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>P. b. russicus</i>	(Brehm, CL, 1831)		V	s	

Lerchen							Larks
<b>Heidelerche</b>	<i>Lullula arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z		Woodlark
	<i>L. a. arborea</i>	(Linnaeus, 1758)					
<b>Weißflügellerche</b>	<i>Alauda leucoptera</i>	Pallas, 1811	B				White-winged Lark
<b>Feldlerche</b>	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW		Eurasian Skylark
	<i>A. a. arvensis</i>	Linnaeus, 1758					
<b>Haubenlerche</b>	<i>Galerida cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	J		Crested Lark
	<i>G. c. cristata</i>	(Linnaeus, 1758)					
<b>Ohrenlerche</b>	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	A		ZW		Horned Lark
	<i>E. a. flava</i>	(Gmelin, JF, 1789)					
<b>Kurzzehenlerche</b>	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	A		S		Greater Short-toed Lark
	<i>C. b. brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)					
	<i>C. b. longipennis</i>	(Eversmann, 1848)					
<b>Kalanderlerche</b>	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	A		S		Calandra Lark
	<i>M. c. calandra</i>	(Linnaeus, 1766)					
<b>Schwarzsteppenlerche</b>	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	(Forster, JR, 1768)	B				Black Lark
<b>Stummellerche</b>	<i>Alaudala rufescens</i>	(Vieillot, 1819)	B				Lesser Short-toed Lark
	<i>A. r. heinei</i>	(Homeyer, 1873)					
Schwalben							Swallows, Martins
<b>Uferschwalbe</b>	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z		Sand Martin
	<i>R. r. riparia</i>	(Linnaeus, 1758)					
<b>Rauchschwalbe</b>	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	Z		Barn Swallow
	<i>H. r. rustica</i>	Linnaeus, 1758					
<b>Felsenschwalbe</b>	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	A	R1	Z		Eurasian Crag Martin
<b>Mehlschwalbe</b>	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z		Common House Martin
	<i>D. u. urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)					
<b>Rötelschwalbe</b>	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	A		S		Red-rumped Swallow
	<i>C. d. rufula</i>	(Temminck, 1835)					
Buschsänger							Cettia Bush Warblers
<b>Seidensänger</b>	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	A	V	S		Cetti's Warbler
	<i>C. c. cetti</i>	(Temminck, 1820)					
Schwanzmeisen							Bushtits
<b>Schwanzmeise</b>	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW		Long-tailed Tit
„Weißkopf-Schwanzmeise“	<i>A. c. caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)				w	
„Streifenkopf-Schwanzmeise“	<i>A. c. europaeus</i>	(Hermann, 1804)					
Laubsänger							Leaf Warblers
<b>Waldlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	A	N5	Z		Wood Warbler
<b>Berglaubsänger</b>	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	A	R3	Z		Western Bonelli's Warbler
<b>Tienschan-Laubsänger</b>	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, WE, 1878)	A		S		Hume's Leaf Warbler
	<i>P. h. humei</i>	(Brooks, WE, 1878)					
<b>Gelbbrauen-Laubsänger</b>	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	A		z		Yellow-browed Warbler

<b>Goldhähnchen-Laubsänger</b>	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)	A	S	Pallas's Leaf Warbler	
<b>Bartlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	(Radde, 1863)	A	S	Radde's Warbler	
<b>Dunkellaubsänger</b>	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)	A	S	Dusky Warbler	
	<i>P. f. fuscatus</i>	(Blyth, 1842)				
<b>Fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	Z	Willow Warbler
	<i>P. t. trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>P. t. acredula</i>	(Linnaeus, 1758)			z	
<b>Zilpzalp</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	A	N6	Z	Common Chiffchaff
„Taigazilpzalp“	<i>P. c. abietinus</i>	(Nilsson, 1819)			Z	
<b>Iberienzilpzalp</b>	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937	A	S	Iberian Chiffchaff	
<b>Kronenlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus coronatus</i>	(Temminck & Schlegel, 1847)	A	s	Eastern Crowned Warbler	
<b>Wacholderlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus nitidus</i>	Blyth, 1843	A	s	Green Warbler	
<b>Middendorff-Laubsänger</b>	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Swinhoe, 1861	A	s	Two-barred Warbler	
<b>Grünlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	(Sundevall, 1837)	A	L1	z	Greenish Warbler
	<i>P. t. viridanus</i>	Blyth, 1843				
<b>Wanderlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus borealis</i>	(Blasius, JH, 1858)	A	S	Arctic Warbler	
<b>Rohrsängerverwandte</b>	<b>Familie Acrocephalidae</b>				<b>Reed Warblers and allies</b>	
<b>Drosselrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Great Reed Warbler
	<i>A. a. arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Mariskenrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	A		S	Moustached Warbler
	<i>A. m. melanopogon</i>	(Temminck, 1823)				
<b>Seggenrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	A	L1	z	Aquatic Warbler
<b>Schilfrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Sedge Warbler
<b>Feldrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)	A		S	Paddyfield Warbler
	<i>A. a. agricola</i> (?)	(Jerdon, 1845)				
	<i>A. a. septimus</i> (?)	Gavrilenko, 1954				
<b>Buschrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849	A	V	S	Blyth's Reed Warbler
<b>Teichrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	A	N5	Z	Eurasian Reed Warbler
	<i>A. s. scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)				
<b>Sumpfrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	A	N5	Z	Marsh Warbler
<b>Buschspötter</b>	<i>Iduna caligata</i>	(Lichtenstein, MHC, 1823)	A		s	Booted Warbler
<b>Steppenspötter</b>	<i>Iduna rama</i>	(Sykes, 1832)	A		s	Sykes's Warbler
<b>Blassspötter</b>	<i>Iduna pallida</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	A		s	Eastern Olivaceous Warbler
	<i>I. p. elaeica</i>	(Lindermayer, 1843)				
<b>Orpheusspötter</b>	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	A	R2	Z	Melodious Warbler
<b>Gelbspötter</b>	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	A	N5	Z	Icterine Warbler
<b>Schwirlverwandte</b>	<b>Familie Locustellidae</b>				<b>Grassbirds</b>	
<b>Streifenschwirl</b>	<i>Helopsaltes certhiola</i>	(Pallas, 1811)	B			Pallas's Grasshopper Warbler
	<i>H. c. rubescens</i>	Blyth, 1845				

<b>Strichelschwirl</b>	<i>Locustella lanceolata</i>	(Temminck, 1840)	A	s	Lanceolated Warbler
	<i>L. l. lanceolata</i>	(Temminck, 1840)			
<b>Feldschwirl</b>	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	A	N4	Z
	<i>L. n. naevia</i>	(Boddaert, 1783)			
<b>Schlagschwirl</b>	<i>Locustella fluviatilis</i>	(Wolf, 1810)	A	R3	Z
<b>Rohrschwirl</b>	<i>Locustella lusciniooides</i>	(Savi, 1824)	A	N3	Z
	<i>L. l. lusciniooides</i>	(Savi, 1824)			
<b>Halmsänger</b>	<b>Familie Cisticolidae</b>				Cisticolas
<b>Zistensänger</b>	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	A	s	Zitting Cisticola
	<i>C. j. cisticola (?)</i>	(Temminck, 1820)			
	<i>C. j. juncidis (?)</i>	(Rafinesque, 1810)			
<b>Grasmückenverwandte</b>	<b>Familie Sylviidae</b>				Sylviid Babblers
<b>Mönchsgrasmücke</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	Z
	<i>S. a. atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)			
<b>Gartengrasmücke</b>	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	A	N6	Z
	<i>S. b. borin</i>	(Boddaert, 1783)			
<b>Sperbergrasmücke</b>	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)	A	R3	Z
	<i>S. n. nisoria</i>	(Bechstein, 1792)			
<b>Klappergrasmücke</b>	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z
	<i>S. c. curruca</i>	(Linnaeus, 1758)			
„Östliche Klappergrasmücke“	<i>S. c. blythii</i>	Ticehurst & Whistler, 1933		s	
<b>Orpheusgrasmücke</b>	<i>Sylvia hortensis</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A	s	Western Orphean Warbler
	<i>S. h. hortensis</i>	(Gmelin, JF, 1789)			
<b>Wüstengrasmücke</b>	<i>Sylvia nana</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	A	s	Asian Desert Warbler
<b>Dorngrasmücke</b>	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	A	N5	Z
	<i>S. c. communis</i>	Latham, 1787			
<b>Provencegrasmücke</b>	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	A	s	Dartford Warbler
	<i>S. u. dartfordiensis (?)</i>	Latham, 1787			
	<i>S. u. undata (?)</i>	(Boddaert, 1783)			
<b>Brillengrasmücke</b>	<i>Sylvia conspicillata</i>	Temminck, 1820	A	V	S
	<i>S. c. conspicillata</i>	Temminck, 1820			
<b>Weißbart-Grasmücke</b>	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	A	s	Subalpine Warbler
„Balkan-Bartgrasmücke“	<i>S. c. albistriata</i>	(Brehm, CL, 1855)		s	
„Iberien-Bartgrasmücke“	<i>S. c. iberiae</i>	Svensson, 2013		s	
<b>Ligurien-Bartgrasmücke</b>	<i>Sylvia subalpina</i>	Temminck, 1820	A	s	Moltoni's Warbler
<b>Samtkopf-Grasmücke</b>	<i>Sylvia melanocephala</i>	(Gmelin, JF, 1789)	A	s	Sardinian Warbler
	<i>S. m. melanocephala</i>	(Gmelin, JF, 1789)			
<b>Goldhähnchen</b>	<b>Familie Regulidae</b>				Goldcrests
<b>Sommergoldhähnchen</b>	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	A	N6	Z
	<i>R. i. ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)			

<b>Wintergoldhähnchen</b>	<i>Regulus regulus</i> <i>R. r. regulus</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	Goldcrest
<b>Zaunkönige</b>	<b>Familie Troglodytidae</b>					Wrens
<b>Zaunkönig</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i> <i>T. t. troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	Eurasian Wren
<b>Kleiber</b>	<b>Familie Sittidae</b>					Nuthatches
<b>Kleiber</b>	<i>Sitta europaea</i> <i>S. e. caesia</i> <i>S. e. europaea</i>	Linnaeus, 1758 Wolf, 1810 Linnaeus, 1758	A	N6	JZW	Eurasian Nuthatch
					s	
<b>Mauerläufer</b>	<b>Familie Tichodromidae</b>					Wallcreeper
<b>Mauerläufer</b>	<i>Tichodroma muraria</i> <i>T. m. muraria</i>	(Linnaeus, 1766) (Linnaeus, 1766)	A	R2	J	Wallcreeper
<b>Baumläufer</b>	<b>Familie Certhiidae</b>					Treecreepers
<b>Waldbaumläufer</b>	<i>Certhia familiaris</i> <i>C. f. macrodactyla</i> <i>C. f. familiaris</i>	Linnaeus, 1758 Brehm, CL, 1831 Linnaeus, 1758	A	N5	J	Eurasian Treecreeper
					ZW	
<b>Gartenbaumläufer</b>	<i>Certhia brachydactyla</i> <i>C. b. megarhynchos</i> <i>C. b. brachydactyla</i>	Brehm, CL, 1820 Brehm, CL, 1831 Brehm, CL, 1820	A	N5	J	Short-toed Treecreeper
					R5	
					R5	
<b>Spottdrosseln</b>	<b>Familie Mimidae</b>					Mockingbirds, Thrashers
<b>Katzenspottdrossel</b>	<i>Dumetella carolinensis</i>	(Linnaeus, 1766)	B			Grey Catbird
<b>Starenverwandte</b>	<b>Familie Sturnidae</b>					Starlings
<b>Rosenstar</b>	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		S	Rosy Starling
<b>Star</b>	<i>Sturnus vulgaris</i> <i>S. v. vulgaris</i>	Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758	A	N6	JZ	Common Starling
<b>Drosseln</b>	<b>Familie Turdidae</b>					Thrushes
<b>Schieferdrossel</b>	<i>Geokichla sibirica</i> <i>G. s. sibirica</i>	(Pallas, 1776) (Pallas, 1776)	A		s	Siberian Thrush
<b>Erddrossel</b>	<i>Zoothera aurea</i> <i>Z. a. aurea</i>	(Holandre, 1825) (Holandre, 1825)	A		S	White's Thrush
<b>Grauwangen-Musendrossel</b>	<i>Catharus minimus</i> <i>C. m. minimus</i>	(Lafresnaye, 1848) (Lafresnaye, 1848)	B			Grey-cheeked Thrush
<b>Zwergmusendrossel</b>	<i>Catharus ustulatus</i> <i>C. u. swainsoni</i>	(Nuttall, 1840) (Tschudi, 1845)	A		s	Swainson's Thrush
<b>Einsiedler-Musendrossel</b>	<i>Catharus guttatus</i> <i>C. g. faxoni</i>	(Pallas, 1811) (Bangs & Penard, TE, 1921)	B			Hermit Thrush
<b>Einfarbdrossel</b>	<i>Turdus unicolor</i>	Tickell, 1833	B			Tickell's Thrush

<b>Ringdrossel</b>	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	A	R3	Z	Ring Ouzel
„Nördliche Ringdrossel“	<i>T. t. torquatus</i>	Linnaeus, 1758			Z	
„Alpenringdrossel“	<i>T. t. alpestris</i>	(Brehm, CL, 1831)				
<b>Amsel</b>	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW	Common Blackbird
	<i>T. m. merula</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Weißbrauendrossel</b>	<i>Turdus obscurus</i>	Gmelin, JF, 1789	A		S	Eyebrowed Thrush
<b>Schwarzkehldrossel</b>	<i>Turdus atrogularis</i>	Jarocki, 1819	A		S	Black-throated Thrush
<b>Rotkehltdrossel</b>	<i>Turdus ruficollis</i>	Pallas, 1776	A		s	Red-throated Thrush
<b>Rostschwanzdrossel</b>	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820	A		s	Naumann's Thrush
<b>Rostflügeldrossel</b>	<i>Turdus eunomus</i>	Temminck, 1831	A		s	Dusky Thrush
<b>Wacholderdrossel</b>	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	JZW	Fieldfare
<b>Rotdrossel</b>	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1758	A	V	ZW	Redwing
„Isländische Rotdrossel“	<i>T. i. coburni</i>	Sharpe, 1901			z	
	<i>T. i. iliacus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Singdrossel</b>	<i>Turdus philomelos</i>	Brehm, CL, 1831	A	N6	Z	Song Thrush
	<i>T. p. clarkei</i>	Hartert, E, 1909			z	
	<i>T. p. philomelos</i>	Brehm, CL, 1831				
<b>Misteldrossel</b>	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	JZ	Mistle Thrush
	<i>T. v. viscivorus</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Wanderdrossel</b>	<i>Turdus migratorius</i>	Linnaeus, 1766	A		s	American Robin
	<i>T. m. migratorius</i>	Linnaeus, 1766				
<b>Schnäpperverwandte</b>	<b>Familie Muscicapidae</b>					<b>Old World Flycatchers</b>
<b>Heckensänger</b>	<i>Cercotrichas galactotes</i>	(Temminck, 1820)	A		S	Rufous-tailed Scrub Robin
	<i>C. g. galactotes</i>	(Temminck, 1820)			s	
	<i>C. g. syriaca</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)			s	
<b>Grauschnäpper</b>	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	A	N5	Z	Spotted Flycatcher
	<i>M. s. striata</i>	(Pallas, 1764)				
<b>Rotkehlchen</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	European Robin
	<i>E. r. rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Blaukehlchen</b>	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Bluethroat
„Rotsterniges Blaukehlchen“	<i>L. s. svecica</i>	(Linnaeus, 1758)			z	
„Weißsterniges Blaukehlchen“	<i>L. s. cyanecula</i>	(Meisner, 1804)				
<b>Sprosser</b>	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R4	Z	Thrush Nightingale
<b>Nachtigall</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Brehm, CL, 1831	A	N5	Z	Common Nightingale
	<i>L. m. megarhynchos</i>	Brehm, CL, 1831				
<b>Rubinkehlchen</b>	<i>Calliope calliope</i>	(Pallas, 1776)	A		s	Siberian Rubythroat
	<i>C. c. calliope</i>	(Pallas, 1776)				
<b>Blauschwanz</b>	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)	A		S	Red-flanked Bluetail
<b>Trauerschnäpper</b>	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	A	N4	Z	European Pied Flycatcher
	<i>F. h. hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)				
<b>Halsbandschnäpper</b>	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	A	R3	Z	Collared Flycatcher
<b>Zwergschnäpper</b>	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	A	R3	Z	Red-breasted Flycatcher

<b>Hausrotschwanz</b>	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(Gmelin, SG, 1774)	A	N5	Z	Black Redstart
	<i>P. o. gibraltaricensis</i>	(Gmelin, JF, 1789)				
„Östlicher Hausrotschwanz“	<i>P. o. phoenicuroides</i>	(Moore, F, 1854)			s	
<b>Gartenrotschwanz</b>	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Common Redstart
	<i>P. p. phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>P. p. samamisicus</i>	(Hablizl, 1783)			s	
<b>Steinrötel</b>	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	A	L1	S	Common Rock Thrush
<b>Blaumerle</b>	<i>Monticola solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	A		s	Blue Rock Thrush
	<i>M. s. solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Braunkehlchen</b>	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	Z	Whinchat
<b>Schwarzkehlchen</b>	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	A	N4	Z	European Stonechat
	<i>S. r. rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Pallasschwarzkehlchen</b>	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	A		S	Siberian Stonechat
	<i>S. m. maurus</i>	(Pallas, 1773)				
<b>Steinschmätzer</b>	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N3	Z	Northern Wheatear
„Grönländer Steinschmätzer“	<i>O. o. leucorhoa</i>	(Gmelin, JF, 1789)			Z	
	<i>O. o. oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Isabellsteinschmätzer</b>	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)	A		S	Isabelline Wheatear
<b>Wüstensteinschmätzer</b>	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)	A		S	Desert Wheatear
	<i>O. d. deserti</i>	(Temminck, 1825)				
<b>Mittelmeer-Steinschmätzer</b>	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	A		S	Black-eared Wheatear
„Maurensteinschmätzer“	<i>O. h. hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)			S	
„Balkansteinschmätzer“	<i>O. h. melanoleuca</i>	(Güldenstädt, 1775)			S	
<b>Zypernsteinschmätzer</b>	<i>Oenanthe cypriaca</i>	(Homeyer, 1884)	B			Cyprus Wheatear
<b>Nonnensteinschmätzer</b>	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)	A		S	Pied Wheatear
 <b>Wasseramseln</b>	 <b>Familie Cinclidae</b>					 <b>Dippers</b>
<b>Wasseramsel</b>	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R4	JW	White-throated Dipper
„Nordische Wasseramsel“	<i>C. c. cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)			w	
	<i>C. c. aquaticus</i>	(Bechstein, 1797)				
 <b>Sperlinge</b>	 <b>Familie Passeridae</b>					 <b>Old World Sparrows,</b>
<b>Haussperling</b>	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	J	House Sparrow
	<i>P. d. domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Feldsperling</b>	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	J	Eurasian Tree Sparrow
	<i>P. m. montanus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Steinsperling</b>	<i>Petronia petronia</i>	(Linnaeus, 1766)	B	0 (B)		Rock Sparrow
	<i>P. p. petronia</i>	(Linnaeus, 1766)				
<b>Schneesperling</b>	<i>Montifringilla nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)	A	R2	J	White-winged Snowfinch
	<i>M. n. nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)				
 <b>Braunellen</b>	 <b>Familie Prunellidae</b>					 <b>Accentors</b>
<b>Alpenbraunelle</b>	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	A	R2	JZ	Alpine Accentor
	<i>P. c. collaris</i>	(Scopoli, 1769)				
<b>Bergbraunelle</b>	<i>Prunella montanella</i>	(Pallas, 1776)	A		s	Siberian Accentor
	<i>P. m. montanella</i>	(Pallas, 1776)				

<b>Schwarzkehlbraunelle</b>	<i>Prunella atrogularis</i>	(Brandt, JF, 1843)	A	s	Black-throated Accentor
	<i>P. a. atrogularis</i>	(Brandt, JF, 1843)			
<b>Heckenbraunelle</b>	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW
	<i>P. m. modularis</i>	(Linnaeus, 1758)			Dunnock
<b>Stelzenverwandte</b>	<b>Familie Motacillidae</b>				
<b>Schafstelze</b>	<i>Motacilla flava</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	Z
„Gelbkopf-Schafstelze“	<i>M. f. flavissima</i>	(Blyth, 1834)		V	z
„Wiesenschafstelze“	<i>M. f. flava</i>	Linnaeus, 1758		N5	Z
„Aschkopf-Schafstelze“	<i>M. f. cinereocapilla</i>	Savi, 1831		V	S
„Maskenschafstelze“	<i>M. f. feldegg</i>	Michahelles, 1830			S
„Thunbergschafstelze“	<i>M. f. thunbergi</i>	Billberg, 1828			Z
<b>Zitronenstelze</b>	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776	A	V	S
	<i>M. c. citreola</i>	Pallas, 1776			Citrine Wagtail
<b>Gebirgsstelze</b>	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	A	N4	JZW
	<i>M. c. cinerea</i>	Tunstall, 1771			Grey Wagtail
<b>Bachstelze</b>	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	A	N5	Z
„Trauerbachstelze“	<i>M. a. yarrellii</i>	Gould, 1837		V	z
	<i>M. a. alba</i>	Linnaeus, 1758			White Wagtail
<b>Spornpieper</b>	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818	A		z
<b>Steppenpieper</b>	<i>Anthus godlewskii</i>	(Taczanowski, 1876)	A		S
<b>Brachpieper</b>	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	Z
<b>Wiesenpieper</b>	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	ZW
<b>Baumpieper</b>	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z
	<i>A. t. trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)			Tree Pipit
<b>Waldpieper</b>	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907	A		S
	<i>A. h. yunnanensis</i>	Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916			Olive-backed Pipit
<b>Petschorapieper</b>	<i>Anthus gustavi</i>	Swinhoe, 1863	A	s	Pechora Pipit
	<i>A. g. gustavi</i>	Swinhoe, 1863			
<b>Rotkehlpieper</b>	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)	A		Z
<b>Pazifikpieper</b>	<i>Anthus rubescens</i>	(Tunstall, 1771)	A		s
	<i>A. r. rubescens</i>	(Tunstall, 1771)			Buff-bellied Pipit
<b>Bergpieper</b>	<i>Anthus spinolella</i>	(Linnaeus, 1758)	A	R3	JZW
	<i>A. s. spinolella</i>	(Linnaeus, 1758)			Water Pipit
<b>Strandpieper</b>	<i>Anthus petrosus</i>	(Montagu, 1798)	A	V	ZW
	<i>A. p. littoralis</i>	Brehm, CL, 1823			Eurasian Rock Pipit
<b>Finken</b>	<b>Familie Fringillidae</b>				
<b>Buchfink</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW
	<i>F. c. coelebs</i>	Linnaeus, 1758			Common Chaffinch
<b>Bergfink</b>	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	A	V	ZW
<b>Kernbeißer</b>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)		A	N5	JZW
	<i>C. c. coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)			Hawfinch
<b>Hakengimpel</b>	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	A		S
	<i>P. e. enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)			Pine Grosbeak

<b>Gimpel</b>	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW	Eurasian Bullfinch
	<i>P. p. pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)			W	
	<i>P. p. europaea</i>	Vieillot, 1816				
<b>Wüstengimpel</b>	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, MHC, 1823)	A	s		Trumpeter Finch
	<i>B. g. zedlitzii</i>	(Neumann, 1907)				
<b>Karmingimpel</b>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	A	R2	Z	Common Rosefinch
	<i>C. e. erythrinus</i>	(Pallas, 1770)				
<b>Grünfink</b>	<i>Chloris chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N6	JZW	European Greenfinch
	<i>C. c. chloris</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Berghänfling</b>	<i>Linaria flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	A	V	W	Twite
	<i>L. f. flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Bluthänfling</b>	<i>Linaria cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW	Common Linnet
	<i>L. c. cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Taigabirkenzeisig</b>	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	A		W	Common Redpoll
„Grönländer Birkenzeisig“	<i>A. f. flammea</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>A. f. rostrata</i>	(Coues, 1861)			s (B)	
<b>Alpenbirkenzeisig</b>	<i>Acanthis cabaret</i>	(Statius Müller, 1776)	A	N4	JZW	Lesser Redpoll
<b>Polarbirkenzeisig</b>	<i>Acanthis hornemannii</i>	(Holbøll, 1843)	A		S	Arctic Redpoll
	<i>A. h. exilipes</i>	(Coues, 1862)			S	
	<i>A. h. hornemannii</i>	(Holbøll, 1843)			s	
<b>Kiefernkreuzschnabel</b>	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793	A	V	S	Parrot Crossbill
<b>Fichtenkreuzschnabel</b>	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Red Crossbill
	<i>L. c. curvirostra</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Bindenkreuzschnabel</b>	<i>Loxia leucoptera</i>	Gmelin, JF, 1789	A	VE	S	Two-barred Crossbill
	<i>L. l. bifasciata</i>	(Brehm, CL, 1827)				
<b>Stieglitz</b>	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	JZW	European Goldfinch
	<i>C. c. carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Zitronenzeisig</b>	<i>Carduelis citrinella</i>	(Pallas, 1764)	A	R2	J	Citril Finch
<b>Girlitz</b>	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	A	N5	Z	European Serin
<b>Erlenzeisig</b>	<i>Spinus spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N4	JZW	Eurasian Siskin
<b>Tundraammern</b>	<b>Familie Calcariidae</b>					Longspurs, Snow Buntings
<b>Spornammer</b>	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	A		ZW	Lapland Longspur
	<i>C. l. lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)				
<b>Schneeammer</b>	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	A		ZW	Snow Bunting
„Isländische Schneeammer“	<i>P. n. nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>P. n. insulae</i>	Salomonsen, 1931			W	
<b>Ammern</b>	<b>Familie Emberizidae</b>					Buntings
<b>Grauammer</b>	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	A	N4	JZW	Corn Bunting
	<i>E. c. calandra</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Goldammer</b>	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	A	N6	JZW	Yellowhammer
	<i>E. c. citrinella</i>	Linnaeus, 1758				
<b>Fichtenammer</b>	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Gmelin, SG, 1771	A		S	Pine Bunting
	<i>E. l. leucocephalos</i>	Gmelin, SG, 1771				

<b>Zippammer</b>	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	A	R2	JZ	Rock Bunting
	<i>E. c. cia</i>	Linnaeus, 1766				
<b>Steinortolan</b>	<i>Emberiza buchanani</i>	Blyth, 1845	A	s		Grey-necked Bunting
	<i>E. b. neobscura</i> (?)	Paynter 1970				
<b>Türkenammer</b>	<i>Emberiza cineracea</i>	Brehm, CL, 1855	B			Cinereous Bunting
	<i>E. c. cineracea</i>	Brehm, CL, 1855				
<b>Ortolan</b>	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	A	R4	Z	Ortolan Bunting
<b>Grauortolan</b>	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1827	A	s		Cretzschmar's Bunting
<b>Zaunammer</b>	<i>Emberiza cirlus</i>	Linnaeus, 1766	A	R2	JZ	Cirl Bunting
<b>Zwergammer</b>	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	A	S		Little Bunting
<b>Waldammer</b>	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	A	S		Rustic Bunting
<b>Weidenammer</b>	<i>Emberiza aureola</i>	Pallas, 1773	A	S		Yellow-breasted Bunting
	<i>E. a. aureola</i>	Pallas, 1773				
<b>Kappenammer</b>	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	A	V	S	Black-headed Bunting
<b>Braunkopfammer</b>	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brandt, JF, 1841	BD		S	Red-headed Bunting
<b>Maskenammer</b>	<i>Emberiza spodocephala</i>	Pallas, 1776	A	s		Black-faced Bunting
	<i>E. s. spodocephala</i>	Pallas, 1776				
<b>Rohrammer</b>	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	A	N5	Z	Common Reed Bunting
	<i>E. s. schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)				
	<i>E. s. tschusii</i>	Reiser & Almásy, 1898			s (B)	
<b>Waldsänger</b>	<b>Familie Parulidae</b>					New World Warblers
<b>Meisenwaldsänger</b>	<i>Setophaga americana</i>	(Linnaeus, 1758)	Ao		s	Northern Parula
<b>Grünmantel-Waldsänger</b>	<i>Setophaga virens</i>	(Gmelin, JF, 1789)	B			Black-throated Green Warbler

**Anhang 1: Kategorie D**

<b>Gluckente</b>	<i>Sibirionetta formosa</i>	(Georgi, 1775)	<b>D</b>	s	Baikal Teal	
<b>Sichelente</b>	<i>Mareca falcata</i>	(Georgi, 1775)	<b>D</b>	S	Falcated Duck	
<b>Chileflamingo</b>	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Molina, 1782	<b>D</b>	L1E	z	Chilean Flamingo
<b>Schmuckreiher</b>	<i>Egretta thula</i>	(Molina, 1782)	<b>D</b>	s	Snowy Egret	
<b>Singammer</b>	<i>Melospiza melodia</i>	(Wilson, A, 1810)	<b>D</b>	s	Song Sparrow	

**Anhang 2: Kategorie E (Auswahl)**

<b>Nandu</b>	<i>Rhea americana</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	L1E	j	Greater Rhea
<b>Zwergkanadagans</b>	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)	<b>E</b>		S	Cackling Goose
<b>Zwergschneegans</b>	<i>Anser rossii</i>	Cassin, 1861	<b>E</b>		S	Ross's Goose
<b>Schneegans</b>	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	L1E	Jz	Snow Goose
<b>Höckergans</b>	<i>Anser cygnoid f. domestica</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	L1E	J	Swan Goose
<b>Schwarzschwan</b>	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790)	<b>E</b>	L1E	J	Black Swan
<b>Moschusente</b>	<i>Cairina moschata</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	VE	j	Muscovy Duck
<b>Brautente</b>	<i>Aix sponsa</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	L1E	J	Wood Duck
<b>Rotschulterente</b>	<i>Callonetta leucophrys</i>	(Vieillot, 1816)	<b>E</b>	VE	S	Ringed Teal
<b>Indien-Fleckschnabelente</b>	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Forster, JR, 1781	<b>E</b>	VE	S	Indian Spot-billed Duck
<b>Dunkelente</b>	<i>Anas rubripes</i>	Brewster, 1902	<b>E</b>		s	American Black Duck
<b>Bahamaente</b>	<i>Anas bahamensis</i>	Linnaeus, 1758	<b>E</b>	VE	S	White-cheeked Pintail
<b>Riesentafelente</b>	<i>Aythya valisineria</i>	(Wilson, A, 1814)	<b>E</b>		s	Canvasback
<b>Rotkopfente</b>	<i>Aythya americana</i>	(Eyton, 1838)	<b>E</b>		s	Redhead
<b>Büffelkopfente</b>	<i>Bucephala albeola</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>		S	Bufflehead
<b>Kappensäger</b>	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>		S	Hooded Merganser
<b>Truthuhn</b>	<i>Meleagris gallopavo</i>	Linnaeus, 1758	<b>E</b>	L1E	j	Wild Turkey
<b>Rothuhn</b>	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	VE	S	Red-legged Partridge
<b>Kubaflamingo</b>	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Linnaeus, 1758	<b>E</b>	L1E	z	American Flamingo
<b>Zwergflamingo</b>	<i>Phoeniconaias minor</i>	(Geoffroy Saint-Hilaire, É, 1798)	<b>E</b>		S	Lesser Flamingo
<b>Pharaonenibis</b>	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	<b>E</b>	VE	S	African Sacred Ibis
<b>Waldrapp</b>	<i>Geronticus eremita</i>	(Linnaeus, 1758)	<b>E</b>	L1E	S	Northern Bald Ibis
<b>Rotgesichtlöffler</b>	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786	<b>E</b>		s	African Spoonbill
<b>Schwarzhalsreiher</b>	<i>Ardea melanocephala</i>	Children & Vigors, 1826	<b>E</b>		s	Black-headed Heron
<b>Dreifarbenreiher</b>	<i>Egretta tricolor</i>	(Statius Müller, 1776)	<b>E</b>		s	Tricolored Heron
<b>Küstenreiher</b>	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	<b>E</b>		S	Western Reef Heron
<b>Rötelpelikan</b>	<i>Pelecanus rufescens</i>	Gmelin, JF, 1789	<b>E</b>		S	Pink-backed Pelican
<b>Ohrenscharbe</b>	<i>Phalacrocorax auritus</i>	(Lesson, R, 1831)	<b>E</b>		s	Double-crested Cormorant
<b>Sperbergeier</b>	<i>Gyps rueppelli</i>	(Brehm, AE, 1852)	<b>E</b>		s	Rüppell's Vulture
<b>Bindenseeadler</b>	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	(Pallas, 1771)	<b>E</b>		s	Pallas's Fish Eagle
<b>Weißkopf-Seeadler</b>	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	(Linnaeus, 1766)	<b>E</b>		s	Bald Eagle

<b>Riesenseeadler</b>	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	(Pallas, 1811)	E	s	Steller's Sea Eagle	
<b>Spornkiebitz</b>	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)	E	s	Spur-winged Lapwing	
<b>Spießflughuhn</b>	<i>Pterocles alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	E	s	Pin-tailed Sandgrouse	
<b>Palmtaube</b>	<i>Spilopelia senegalensis</i>	(Linnaeus, 1766)	E	s	Laughing Dove	
<b>Virginiauhu</b>	<i>Bubo virginianus</i>	(Gmelin, JF, 1788)	E	s	Great Horned Owl	
<b>Buntfalke</b>	<i>Falco sparverius</i>	Linnaeus, 1758	E	S	American Kestrel	
<b>Lannerfalke</b>	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	E	s	Lanner Falcon	
<b>Gelbkopfamazone</b>	<i>Amazona oratrix</i>	Ridgway, 1887	E	L1E	j	Yellow-headed Amazon
<b>Blaustirnamazone</b>	<i>Amazona aestiva</i>	(Linnaeus, 1758)	E	VE	j	Turquoise-fronted Amazon
<b>Alexandersittich</b>	<i>Psittacula eupatria</i>	(Linnaeus, 1766)	E	L1E	j	Alexandrine Parakeet
<b>Azurlester</b>	<i>Cyanopica cyanus</i>	(Pallas, 1776)	E	s	Azure-winged Magpie	
<b>Elsterdohle</b>	<i>Coloeus dauuricus</i>	(Pallas, 1776)	E	s	Daurian Jackdaw	
<b>Bergkalanderlerche</b>	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	(Ménétriés, 1832)	E	s	Bimaculated Lark	
<b>Hirtenmaina</b>	<i>Acridotheres tristis</i>	(Linnaeus, 1766)	E	VE	S	Common Myna
<b>Mongolenstar</b>	<i>Agropsar sturninus</i>	(Pallas, 1776)	E	s	Daurian Starling	
<b>Amurdrossel</b>	<i>Turdus hortulorum</i>	Sclater, PL, 1863	E	s	Grey-backed Thrush	
<b>Fahldrossel</b>	<i>Turdus pallidus</i>	Gmelin, JF, 1789	E	s	Pale Thrush	
<b>Rußschnäpper</b>	<i>Muscicapa sibirica</i>	Gmelin, JF, 1789	E	s	Dark-sided Flycatcher	
<b>Saharasteinschmätzer</b>	<i>Oenanthe leucopyga</i>	(Brehm, CL, 1855)	E	s	White-crowned Wheatear	
<b>Meisengimpel</b>	<i>Carpodacus sibiricus</i>	(Pallas, 1773)	E	S	Long-tailed Rosefinch	
<b>Wiesenammer</b>	<i>Emberiza cioides</i>	Brandt, JF, 1843	E	s	Meadow Bunting	
<b>Gelbkehlammer</b>	<i>Emberiza elegans</i>	Temminck, 1836	E	s	Yellow-throated Bunting	
<b>Fuchssammer</b>	<i>Passerella iliaca</i>	(Merrem, 1786)	E	s	Red Fox Sparrow	
<b>Dachammer</b>	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, JR, 1772)	E	s	White-crowned Sparrow	
<b>Weißkehlammer</b>	<i>Zonotrichia albicollis</i>	(Gmelin, JF, 1789)	E	VE	s	White-throated Sparrow
<b>Braunkopf-Kuhstärling</b>	<i>Molothrus ater</i>	(Boddaert, 1783)	E	s	Brown-headed Cowbird	
<b>Rosenbrust-Kernknacker</b>	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	(Linnaeus, 1766)	E	s	Rose-breasted Grosbeak	
<b>Indigofink</b>	<i>Passerina cyanea</i>	(Linnaeus, 1766)	E	s	Indigo Bunting	
<b>Lazulifink</b>	<i>Passerina amoena</i>	(Say, 1822)	E	s	Lazuli Bunting	